

Thuốc nhỏ mắt

TraphaEYES



15 ml

Traphaco[®]



CÔNG THỨC:
Hydroxypropyl
Methylcellulose.....45 mg
Tá dược (Naatri clorid, kali
clorid, acid phosphoric,
benzaikonium clorid, naatri
borat, acid boric, nước
cất).....vđ.....15 ml

CHỈ ĐỊNH:

Phòng ngừa và làm
giảm các triệu chứng
của bệnh khô mắt: cảm
giác mắt bị khô, rát, ra
giờ mắt trong và nhầy,
nhìn mờ nhất thời, như
có dị vật trong mắt
do các yếu tố tiết dịch
và yếu tố môi trường
trong các trường hợp:

- Làm việc lâu dài trong
phòng máy lạnh, tiếp xúc
nhiều với máy vi tính, TV,
kinh hiển vi và các
nguồn sáng nhân tạo.
- Tiếp xúc thường xuyên
với nắng, với môi trường
ô nhiễm: khói xe, bụi
bụi...
- Người cao tuổi.

Eye drops

TraphaEYES



15 ml

Traphaco[®]



Lọ thuốc đã mở không nên sử dụng quá 2 tuần.
ĐỂ XÁ TẨM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Vạn Nam - Số 09 Phường 11 TP.HCM - Số 04/41.208.137/24 /TMZ - GIAO 02/2011/QC
Tư vấn thuốc: 1900.61.1900
Số điện thoại: 0800.10.0000 (Hàng Ngày)
Số điện thoại: 0800.10.0001 (Hàng Thứ 7 - Chủ Nhật)

**LIỀU DÙNG - CÁCH
DÙNG, CHỐNG CHI
ĐỊNH:**

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không
quá 30 °C, tránh ánh sáng.

Tờ hướng dẫn sử dụng

Thuốc nhỏ mắt TRAPHAEYES

TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ 15 ml

THÀNH PHẦN: cho 1 lọ 15 ml

Hydroxypropyl methylcellulose

Tá dược (*Natri clorid, Kali clorid, Acid phosphoric, Benzalkonium clorid, Natri borat.10 H₂O, Acid boric, nước cất*)

45mg
vd 15ml

TÁC DỤNG: Thuốc nhỏ mắt Traphaeys làm giảm các triệu chứng khô mắt bằng cách kéo dài thời gian vỡ của màng phim nước mắt, tăng tính ổn định của màng phim nước mắt trên bề mặt nhãn cầu.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng của bệnh khô mắt: cảm giác mắt bị khô, rát, ra giòi mắt trong và nhầy, nhìn mờ nhất thời, như có dị vật trong mắt... do các yếu tố tiết dịch và yếu tố môi trường trong các trường hợp:

- Làm việc lâu dài trong phòng máy lạnh, tiếp xúc nhiều với máy vi tính, tivi, kính hiển vi và các nguồn sáng nhân tạo.
- Tiếp xúc thường xuyên với nắng, với môi trường ô nhiễm: khói xe, bụi bặm,...
- Người cao tuổi

LIỆU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Mỗi lần nhỏ vào mỗi mắt 1 - 2 giọt, 4 - 6 lần/ngày để phòng ngừa và điều trị chứng khô mắt nhẹ, 10 - 12 lần/ngày trong trường hợp nặng.

Lưu ý: lọ thuốc đã mở không nên sử dụng quá 2 tuần

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có thông báo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

THẬN TRỌNG:

Ngưng dùng nếu thấy mắt khô chịu hay dị ứng. Cần thận đối với kính áp tròng.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Chưa có tương tác thuốc được ghi nhận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC: không ảnh hưởng

QUẢ LIỆU VÀ XỬ TRÍ

- Cho đến nay chưa thấy báo cáo nào về biểu hiện quá liều xảy ra ở người bệnh.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NÉU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THÀY THUỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội