



# FRANCEFDI 300



## THÀNH PHẦN:

Thành phần hoạt chất: Cefdinir..... 300mg

Thành phần tá dược:..... Vừa đủ 1 viên nang.

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang màu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu trắng nâu  
Hộp 1 vỉ x 10 viên nang

## CHỈ ĐỊNH:

Thuốc Cefdinir 300mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau:

Người lớn và thiếu niên:

- Viêm họng và viêm amidan do *Streptococcus pneumoniae* nhạy cảm (*Streptococcus* tán huyết nhóm A-beta).

- Viêm xoang cấp tính do *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* (gồm cả chủng sinh  $\beta$ -lactamase).

- Các đợt cấp nhẹ đến trung bình trong viêm phế quản mãn do *S.Pneumoniae* nhạy cảm với penicillin, *H.influenzae*, *H.parainfluenzae* hoặc *M. catarrhalis*.

- Viêm phổi mắc phải cộng đồng từ nhẹ đến trung bình do *Streptococcus pneumoniae* nhạy cảm hoặc các chủng sinh  $\beta$ -lactamase hay không sinh của  $\beta$ -lactamase của *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, và *Moraxella catarrhalis*.

- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng gây ra bởi *Staphylococcus aureus* (gồm cả chủng sinh  $\beta$ -lactamase) và *Streptococcus pyogenes*.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với kháng sinh nhóm Cephalosporin.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Thuốc bổ sung sắt và thức ăn có chứa sắt, Antacid (chứa nhôm hoặc magesi) làm giảm khả năng hấp thu thuốc, nên uống Cefdinir trước hoặc sau 2 giờ.

- Probenecid tăng hấp thu thuốc và kéo dài thời gian bán thải thuốc.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Hiếm gặp: buồn nôn, đau bụng, viêm ruột màng giả.

- Phản ứng quá mẫn: dị ứng ở dạng phát ban, ngứa nổi mề đay.

Các phản ứng này thường giảm khi ngưng thuốc.

- Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## THẬN TRỌNG:

- Người có tiền sử quá mẫn cảm với Penicilin, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có tiền sử viêm ruột kết.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

## LIỀU LƯỢNG – CÁCH DÙNG:

Uống cả viên thuốc với nước. Có thể uống thuốc trong hoặc xa bữa ăn.

Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

Chỉ định	Liều dùng	Thời gian dùng
Đợt cấp trong viêm phế quản mãn	300 mg mỗi 12h	5-10 ngày
	Hoặc 600 mg mỗi 24h	10 ngày
Viêm xoang cấp tính	300 mg mỗi 12h	10 ngày
	Hoặc 600 mg mỗi 24h	10 ngày
Viêm họng/ viêm amidan	300 mg mỗi 12 giờ	5-10 ngày
	Hoặc 600 mg mỗi 24h	10 ngày
Viêm phổi mắc phải cộng đồng	300mg mỗi 12h	10 ngày
Nhiễm trùng da và cấu trúc da	300mg mỗi 12h	10 ngày

- Bệnh nhân suy thận: Độ thanh thải < 30ml/phút, liều dùng tối đa 300mg/lần ngày 1 lần.

## BẢO QUẢN:

- Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 25° C, tránh ánh sáng.

- Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

**HẠN SỬ DỤNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất.