

### 3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

Rx  
Thuốc bán theo đơn

## HEPTAMINOL 187,8 mg

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén chứa

- Heptaminol hydrochlorid ..... 187,8 mg
- Tá dược: Starch 1500, Tinh bột mì, Povidon, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, Aerosil.

**DẠNG BÀO CHÉ:** Viên nén.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

Hộp 2 vi x 10 viên.

**CHỈ ĐỊNH:**

Điều trị triệu chứng trong hạ huyết áp tư thế, đặc biệt trong trường hợp do dùng thuốc hướng tâm thần.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Dùng uống

Người lớn: 1 – 2 viên, 3 lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Tăng huyết áp động mạch nặng.
- Cường giáp
- Phù não, động kinh.
- Kết hợp với IMAO (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát).

**THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:**

Nếu nghi ngờ, cần hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Các vận động viên thể thao cần lưu ý vì loại dược phẩm này có chứa một hoạt chất có thể cho kết quả dương tính các xét nghiệm khi kiểm tra các chất bị cấm sử dụng.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Tính vô hại chưa được chứng minh. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến Bác sĩ khi điều trị cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**ÂM HUỐNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:**

- IMAO: Không phối hợp (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát).
- Guanéthidine và các thuốc cùng họ: Khuyên không nên phối hợp (tăng tác dụng hạ huyết áp).

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Thường gặp: Phát ban, nổi mề đay, phù mạch, nhịp tim nhanh, giãnձòng tử.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Trong trường hợp quá liều cần theo dõi huyết áp và nhịp tim tại bệnh viện.

**ĐƯỢC LỰC HỌC:**

- Thuốc hồi sức tim mạch.
- Heptaminol hydrochlorid là một chất kích thích tim, thuốc giãn mạch và đã được sử dụng trong điều trị các rối loạn tim mạch.

**ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Heptaminol được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống. Nồng độ thuốc trong huyết tương cực đại sau 1,8 giờ. Diện tích dưới đường cong của nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian khi dùng uống tương đương với khi tiêm tĩnh mạch. Thời gian bán thải từ 2,5 – 2,7 giờ. Heptaminol không chuyền hóa và được đào thải qua thận trong khoảng 24 giờ.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**ĐỂ XÃ TÀM TAY TRẺ EM**

**NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI**

**CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

Địa chỉ: 66 - Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điện thoại: (067) - 3859370 - 3852278

