

Hộp Alpha TASE (120 x 50 x 35 mm)

US PHARMA USA

α-tase
Alphachymotrypsin 4200 USP unit

Oral or sublingual

Box of 5 blisters x 10 tablets

WHO GMP

Chức năng: chống chỉ định, tiêu diệt, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn có đính kèm trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
L9 B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.

US PHARMA USA

α-tase
Alphachymotrypsin 4200 USP unit

Box of 5 blisters x 10 tablets

WHO GMP

Chỉ định, chống chỉ định, tiêu diệt, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn có đính kèm trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
L9 B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.

US PHARMA USA

α-tase
Alphachymotrypsin 4200 USP unit

Box of 5 blisters x 10 tablets

WHO GMP

Chỉ định, chống chỉ định, tiêu diệt, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn có đính kèm trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
L9 B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.

US PHARMA USA

α-tase
Alphachymotrypsin 4200 USP unit

Box of 5 blisters x 10 tablets

WHO GMP

Chỉ định, chống chỉ định, tiêu diệt, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn có đính kèm trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
L9 B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.

VI Alpha TASE (96 x 42 mm)





R. Thuốc bán theo đơn

α - TASE

Viên nén Alpha-chymotrypsin 4200 đơn vị USP

Thành phần

Mỗi viên nén chứa :

Alpha-chymotrypsin 4200 đơn vị USP (tương đương 4,2 mg)

Tá dược: Đường RE, Dextrous khan, Kleptose, Magnesi stearat, Menthol.

Phân loại

Dược chất chính của thuốc là Alpha-chymotrypsin thuộc nhóm enzyme thủy phân protein

Dược lực học:

Alpha-chymotrypsin là enzym thủy phân protein có tác dụng tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liền kề các acid amin có nhân thơm.

Alpha-chymotrypsin được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

Dược động học:

Chưa có báo cáo

Chỉ định

Alpha-chymotrypsin được chỉ định điều trị trong các trường hợp phù nề sau chấn thương hay sau phẫu thuật.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Liều dùng và cách dùng

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

Liều dùng thông thường như sau:

Uống: 2 viên/lần, 3 - 4 lần mỗi ngày hoặc ngâm dưới lưỡi 4 - 6 viên mỗi ngày chia làm nhiều lần

Cách dùng

Uống nguyên viên thuốc với nhiều nước hay để viên thuốc tan dần dưới lưỡi

Chống chỉ định

Quá mẫn với Alpha-chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Thận trọng

Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng Alpha-chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng Alpha-chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm sinh.

Phụ nữ mang thai, cho con bú:

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc khi sử dụng cho Phụ nữ có thai và cho con bú. Nên dùng thuốc khi thật cần thiết và dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc : Chưa có tương tác thuốc được báo cáo

Tác dụng phụ

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của Alpha-chymotrypsin là tăng nhất thời nhãn áp. Dùng trong nhãn khoa, có thể gặp phù giác mạc, viêm nhẹ màng bồ đào.

Quá liều và cách xử trí

Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Alpha-chymotrypsin

Trong trường hợp quá liều hoặc trẻ em uống nhầm thuốc, chuyển ngay bệnh nhân đến trung tâm Y tế gần nhất và mang theo toa thuốc này.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Dạng trình bày

Hộp 2 vỉ, vỉ 10 viên

Hộp 5 vỉ, vỉ 10 viên



7/14

Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên

Tiêu chuẩn

Nhà sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08-38230108



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

