

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GEL UỐNG

A.T PEPCONE

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Dimethicon3.000 mg

Guaiazulen4 mg

Tá dược: Vừa đủ 1 gói 10 g.

(Xanthan gum, tabulose, sorbitol 70%, methyl paraben, propyl paraben, propylen glycol, natri saccharin, tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Gel uống.

Mô tả sản phẩm: Gel uống màu xanh, vị ngọt, hương bạc hà.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng đau dạ dày.

Dùng trong trường hợp bị trướng bụng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng: Liều thông thường được khuyến cáo là 1 - 2 gói, 2 - 3 lần mỗi ngày.

Cách dùng: Uống trực tiếp gel trong gói, uống trước bữa ăn hoặc khi có cơn đau.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với các hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển xấu hơn, nên đi khám bác sĩ.

Cảnh báo tá dược

Thuốc có chứa methyl paraben, propyl paraben có thể gây phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).

Thuốc có chứa sorbitol, thuốc này chống chỉ định ở những người bị rối loạn không dung nạp fructose do di truyền.


SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Có thể dùng dimethicon cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Chưa có dữ liệu lâm sàng về tác động của guaiazulen ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp dị tật cụ thể nào được báo cáo.

Do đó, thuốc này có thể dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC



Chưa có các nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Dựa trên các đặc tính về dược động học của thuốc, sự kết hợp của dimethicon và guaiazulen không chắc ảnh hưởng đến khả năng này.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Hiếm khi xảy ra phản ứng quá mẫn như phát ban hoặc ngứa.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Chưa ghi nhận trường hợp nào quá liều. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được theo dõi và điều trị triệu chứng thích hợp.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc điều trị rối loạn chức năng dạ dày - ruột.

Mã ATC: A03AX

Dimethicon là một chất trơ có tác dụng chống tạo bọt, do khả năng thay đổi sức căng bề mặt của nó.

Sản phẩm thuốc này không cản tia X.

Dược động học

Khi sử dụng liều cao hơn hẳn so với liều khuyến cáo điều trị, guaiazulen được tìm thấy ở dạng vết trong huyết tương.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10 g.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản xuất tại nhà máy:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo