

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
**THUỐC XỊT MŨI AGERHININ 15 ml**

**Tính chất:** Thuốc xịt mũi Agerhinin 15 ml có thành phần hoạt chất chính kỹ hiệu là bột Sp3, được chiết xuất và tinh chế từ bộ phận trên mặt đất của ngũ sắc (*Ageratum conyzoides* L.)

**Công thức bào chế 1 lọ 15 ml:**

Hoạt chất	Hàm lượng
Bột Sp3	750,0 mg

(tương đương 15 g cây ngũ sắc: *Ageratum conyzoides* L.)

**Tá dược**

Natri borat	90,0 mg
Nipagin	11,25 mg
Nipazol	3,75 mg
Nước cất vừa đủ	15,0 ml

**Đặc tính dược lực học:** Thuốc có tác dụng giảm viêm, giúp đào thải nhanh ra ngoài các chất bị hoại tử và ứ đọng trong khoang mũi do viêm nhiễm gây ra, do đó tăng hiệu quả điều trị trong các bệnh viêm mũi nhiễm trùng, viêm mũi, viêm xoang dị ứng.

**Đặc tính dược động học:** Hấp thu tốt vào niêm mạc mũi.

**Dạng bào chế:** Thuốc nước xịt mũi

**Chỉ định:** Điều trị viêm mũi nhiễm trùng, viêm mũi và viêm xoang dị ứng.

**Liều dùng:** Mỗi ngày xịt 3 - 4 lần, mỗi lần 1 - 2 cái vào mỗi bên mũi.

**Cách dùng:** Khi dùng lần đầu, mở nắp đầu xịt, cầm lọ thẳng đứng xịt vào không khí để thuốc phá màng bảo vệ của đầu xịt. Sau đó hướng đầu xịt thẳng vào mũi xịt mạnh, đồng thời hít nhẹ để thuốc đi sâu vào khoang mũi. Dùng xong đậy nắp đầu xịt. Chỉ dùng thuốc trong 1 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng.

**Chống chỉ định:** Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

**Tác dụng không mong muốn:** Do tính chất đặc trưng của dược liệu nên thuốc có thể gây xót nhẹ tức thời. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**Tương tác với các thuốc khác và thực phẩm khác:** Mặc dù chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác nhưng khuyến cáo không nên dùng đồng thời với các thuốc xịt và nhỏ mũi khác.

**Xử lý khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:** Tham vấn ý kiến bác sĩ

**Thận trọng khi dùng thuốc:** Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn, không dùng thuốc bị biến màu.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Quy cách đóng gói:** Thuốc đóng lọ 15 ml, mỗi lọ đóng trong một hộp, 10 hộp đóng trong một màng co. Thuốc được dán nhãn đúng quy chế.

**Chú ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất:

**VIỆN DƯỢC LIỆU**

Địa chỉ: 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội