

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

AGIPHYLAMIN

Đề xa tầm tay trẻ em

Lắc kỹ trước khi dùng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần công thức:

Thành phần hoạt chất:

- Cao khô Bèo hoa dâu (1:10) 4,32% (kl/tt)
(*Extractum Herbae Azollae microphyllae siccum*)

Thành phần tá dược: Sorbitol, Xanthan gum, Kali sorbat, Acid citric monohydrat, Hương Tutti frutti, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Siro thuốc màu vàng nâu, sánh, vị ngọt và thơm mùi trái cây.

Chỉ định:

Dùng cho trẻ em và người lớn bị thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu về acid amin, khoáng chất do suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể và sau khi ốm dậy.

Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Uống thuốc sau bữa ăn.

Liều dùng:

Người lớn: Uống 20 - 40 ml x 2 lần/ngày.

Trẻ em trên 3 tuổi: Uống 5 - 10 ml x 2 lần/ngày.

Chống chỉ định:

Không có chống chỉ định.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Người bị tiểu đường, đường huyết cao.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, nên thận trọng khi sử dụng thuốc cho đối tượng này.

Không có thông tin về độc tính trên thai nhi.

Ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Vẫn chưa phát hiện được việc uống chung Agiphylamin với các thuốc khác có gây ra những tác dụng không mong muốn hay không.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

Gói 5 ml, 20 ml. Hộp 10 gói hoặc 30 gói.

Chai 30 ml, 60 ml, 100 ml. Hộp 1 chai.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng quá 90 ngày kể từ ngày mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở.



Cơ sở đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm – Bình Hòa

Lô C4 KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam

An Giang, ngày 08... tháng 08... năm 2024

TL. Tổng giám đốc

PTGD. Quản lý Chất lượng



DS. Phạm Thị Bích Thủy