

<https://trungtamthuoc.com/>
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC.**

THUỐC GIỌT **AIR-X**

VISA NO: VN-14124-11

Chữa đầy hơi và trướng bụng.

Các rối loạn tiêu hóa có xu hướng liên quan đến sự tích tụ quá mức hơi ở dạ dày, ruột. Các triệu chứng thông thường nhất là cảm giác bị ép, căng và đầy thượng vị, ợ hơi, trung tiện. Thuốc giọt AIR-X giúp điều trị chứng tích tụ hơi bất thường như trên ở đường tiêu hóa. Thuốc giọt AIR-X có chứa dimethylpolysiloxan hoạt hóa, 1 chất diện hoạt (chất hoạt động bề mặt) làm cho các bọt khí được bao phủ bởi chất nhầy trong dạ dày và ruột bị vỡ ra.

THÀNH PHẦN:

0,6ml chế phẩm (12 giọt) chứa 40mg simethicon (USP 32).

Tá dược:

Methylcellulose, Dung dịch sorbitol 70%, Polysorbat 80, Natri methylparaben, Natri propylparaben, Màu Erythrosin, Hương dâu, Nước tinh khiết.

MÔ TẢ:

Hỗn dịch màu trắng phớt hồng, có mùi dâu tây.

CHỈ ĐỊNH:

Tích tụ hơi ở đường tiêu hóa, cảm giác bị ép và đầy ở vùng thượng vị, trướng bụng tạm thời do không cẩn thận trong chế độ ăn hay thiếu tập thể dục, trướng bụng sau khi giải phẫu; hội chứng dạ dày - tim, chuẩn bị cho xét nghiệm X-quang (dạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày. Ợc sữa ở trẻ nhỏ do đầy hơi.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Sử dụng ống nhỏ giọt để đo thể tích.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 0,3ml (6 giọt) sau các bữa ăn hay bú.

Trẻ em trên 2 tuổi: 0,6 - 1,2 ml (12 - 24 giọt) sau các bữa ăn.

Chỉ sử dụng thuốc trong vòng 6 ngày kể từ khi mở nắp lần đầu. Nhớ vặn chặt nắp sau khi sử dụng.

THẬN TRỌNG:

Không được sử dụng quá 12 liều dùng trong một ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

Thuốc AIR-X giọt làm giảm đáng kể triệu chứng và loại bỏ khí gây chứng đầy hơi. Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của thuốc giọt AIR-X, dimethylpolysiloxan, không được hấp thu vào dạ dày và ruột, do đó thường không có bất kỳ tác động gây hại nào cho cơ thể.

Phải thông báo ngay cho thầy thuốc, nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tương tác thuốc nào giữa thuốc Air-X giọt với thuốc khác được báo cáo.

TIÊU CHUẨN:

USP 32.

HẠN DÙNG:

2 năm tính từ ngày sản xuất.

CẢNH BÁO:

Không dùng thuốc này khi quá hạn dùng ghi trên bao bì đựng thuốc, khi thuốc đổi màu hay có mùi lạ, khi hỗn dịch thuốc bị tách thành 2 lớp.

ĐỂ THUỐC NGOÀI TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐÓNG GÓI:

Chai thủy tinh nâu 15ml, đựng trong hộp giấy có kèm ống nhỏ giọt bằng polyetylen.

BẢO QUẢN:

Trong bao bì thật kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng (<30°C).

Sản xuất tại
POLIPHARM CO.,LTD
109 Mu 12 Bangna Trad Road Km. 13
Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand
Tel : (66-2) 3169419-21