

## LEUCIN 500mg/5ml

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Đeo xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. Thành phần công thức thuốc: cho 1 ống:

- Thành phần hoạt chất:

N – Acetyl – DL – Leucin .....500 mg

- Thành phần tá dược:

Monoethanolamin, nước cất pha tiêm .....vỡ 5 ml

2. Dạng bào chế:

2.1. Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

2.2. Mô tả dạng bào chế:

Dung dịch trong, không màu hoặc gần như không màu.

3. Chỉ định:

Điều trị triệu chứng của các cơn chóng mặt.

4. Liều dùng và cách dùng:

4.1. Liều dùng

Người lớn:

- 2 ống mỗi ngày (có thể đến 4 ống nếu cần thiết).

- Thời gian điều trị tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng.

4.2. Cách dùng

Tiêm trực tiếp tĩnh mạch.

4.3. Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng:

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng.

5. Chống chỉ định

Mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kì thành phần khác của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chưa tìm thấy thông tin về cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Với dữ liệu sẵn có, tốt nhất không nên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

8. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành