

Công thức :

- Vitamin A (Retinol acetat)..... 1500 IU
 - Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid)..... 2,5 mg
 - Vitamin B2 (Riboflavin) 2,5 mg
 - Vitamin B5 (Calci pantothenat)..... 2,5 mg
 - Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)..... 0,75 mg
 - Vitamin PP (Nicotinamid) 12,5 mg
 - Vitamin E (Alpha tocopherol acetat) 5 mg
 - Tá dược vđ 1 viên bao đường
- (Tinh bột, đường, PVP, talc, magnesi stearat, acid benzoic, sáp ong, calci carbonat, gelatin, oxyd sắt nâu)

Chỉ định :

- Dùng để bổ sung Vitamin thiếu hụt hoặc đáp ứng nhu cầu của cơ thể tăng trong các trường hợp : Trẻ em suy dinh dưỡng, chậm lớn, phụ nữ có thai, cho con bú. Bệnh nhân đang điều trị cũng như đang trong thời kỳ hồi phục, người già.
- Giúp phòng và điều trị tình trạng thiếu vitamin như trong bệnh thiếu máu, bệnh beri-beri, bệnh Pellagra, trong hoặc sau xạ trị, trong điều trị lâu dài bằng thuốc kháng sinh và thuốc kháng lao.

Liều dùng: - Người lớn: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

- Trẻ em : Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2-3 lần.

Chống chỉ định : Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Tác dụng phụ: - Nước tiểu có thể bị vàng do Vitamin B2.

- Phản ứng dị ứng, biểu hiện thần kinh ngoại vi.

Tương tác thuốc : Không dùng khi đang sử dụng Levodopa, trừ khi có phối hợp với một chất ức chế men dopadecarboxylase.

Trình bày : - Hộp 1 chai 50 viên

- Hộp 06 vỉ; 10 vỉ x 10 viên

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn : TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC

CÔNG TY DƯỢC PHẨM USA - NIC

Lô 11D - đường C - KCN Tân Tạo - TP. HCM - Việt Nam

ĐT : (08) 37.541.999 (5 lines)

Fax : (08) 37.543.999