

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG ALTADINE

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Trong 100 ml nước súc miệng ALTADINE chứa:

Thành phần dược chất:

Povidone-iodine 1 gam.

Thành phần tá dược:

Natri saccharin, PEG 400, menthol, methyl salicylat, ethanol, nước tinh khiết vừa đủ 100 ml.

2. DẠNG BẢO CHẾ: Nước súc miệng.

Mô tả: Dung dịch trong, màu nâu đỏ sẫm, mùi đặc biệt của iod.

3. CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường hợp sau:

- Điều trị các trường hợp viêm, nhiễm khuẩn ở miệng, họng như viêm miệng, viêm lợi, loét aptơ, viêm họng, viêm amidan, nhiễm nấm candida, nhiễm lạnh, cúm.
- Dự phòng trong, sau khi phẫu thuật như sau khi cắt amidan và sau phẫu thuật nha khoa.
- Dùng thường kỳ để vệ sinh răng miệng.

4. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng:

- Thuốc dùng ngoài. Không được tiêm hoặc uống.
- Dùng dung dịch không pha hoặc pha loãng một nửa với nước ấm.

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Mỗi lần súc miệng khoảng 10 ml trong 30 giây và không được nuốt. Ngày có thể súc miệng tới 4 lần và có thể kéo dài tới 14 ngày liền.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với iod hoặc povidon hay bất kì thành phần tá dược nào.
- Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi.
- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân colloid), bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Không nên sử dụng cùng một lúc với nhiều loại thuốc súc miệng có chất sát khuẩn nếu không có ý kiến và sự theo dõi chặt chẽ của thầy thuốc tại mũi họng.
- Chỉ dùng để súc miệng. Trong trường hợp gặp kích ứng tại chỗ hoặc mẫn cảm thì ngừng sử dụng thuốc.
- Không được uống. Để xa tầm tay trẻ em.

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Tránh dùng cho thường xuyên cho phụ nữ mang thai và cho con bú vì iod qua được hàng rào nhau thai và bài tiết qua sữa.



Mặc dù chưa có bằng chứng về nguy hại, những vấn đề nên thận trọng và cân nhắc khi sử dụng.

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng gì.

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein.
- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da. Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khác.
- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp.

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Nước súc miệng ALTADINE cũng có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu không dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, như phát ban, ngứa họng và miệng, phồng rộp môi, mặt đỏ, toát mồ hôi.

Nếu gặp bất cứ dấu hiệu bất thường nào, phải dừng ngay việc dùng thuốc và báo cho bác sĩ biết để kịp thời xử trí, có thể thay thuốc hoặc điều trị bằng phương pháp khác.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp.

Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon-iod phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 60 ml, 100 ml, 120 ml, 250 ml.

13. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nhiệt độ dưới 30 °C, trong lọ kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp.

14. HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

15. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

16. TÊN, ĐỊA CHỈ, BIỂU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

115 Ngô Gia Tự - P. Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng



17. DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ TIẾP THỊ:

CÔNG TY TNHH ALPHA FRANCE PHARMA

VP miền Nam: Lầu 7 toà nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

VP miền Bắc: LK 03-02, khu đô thị An Hưng, P. La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội



feel sense, treat well

