

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 04/03/2014

CÔNG TY LTD MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU GÓI



Tp.HCM, ngày 40 tháng 06 năm 2015

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC




ĐS. Hồ Văn Toàn

114/444





CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU HỘP



CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU HỘP




Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2013

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Đỗ Vũ Trí



TỔ HUỐNG DẢN SỬ DỤNG
ANDONBIO

Gói 1g

Công thức:

Lactobacillus acidophilus.....75 mg

(Üng với vi sinh sống.....10 CFU)

Tá dược vita dù 1 gói: Maltodextrin, Lactose anhydrous, Fructo-Oligosaccharid (FOS), Acid ascorbic, Silica colloidal anhydrous, Bột hương cam.

Dung bao chí: Thuốc bột uống.

Chỉ định:

Bệnh tri phổi trong ta chảy cùng với biến phổi tiếp nước và điện giải.

Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.

Lưu ý và cách dùng:

Cách dùng: Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước dun sôi để nguội.

Lưu dung: 1 gói /lần, ngày uống 3-4 lần.

Cách chỉ định: *Thuốc này chỉ là 1 thứ yếu trong điều trị ta chảy chưa có biến chứng mủ nước và đễn giải của người bệnh. Trước khi dùng bài chí đồng thuốc nào, cần phải đánh giá đúng tính trạng mủ nước và đễn giải của người bệnh.*

Chống chỉ định: *Thuốc này chỉ đồng thuốc nào, cần phải đánh giá đúng tính trạng mủ nước và đễn giải của người bệnh.*

Không dùng cho người sót cao trứ khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Chế phẩm này có chứa lactose, không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại.

Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

Trong tác dụng, các dạng tương tác khác:

Chưa có tài liệu nêu ra tương tác thuốc.

Sử dụng thuốc cho phu nữ có thai và cho con bú:

Trời kỳ mang thai: Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít.

Tot nhất là không dùng khi mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Không chứng chí định với phu nữ cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lạm sử và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhung hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị. Nhiều acid chuyển hóa đã xảy ra khi dùng viên nén, đổi khí táo bón.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều ANDONBIO.

Thông báo cho thày thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc:

Dosing guide: gói 1g, hộp 25 gói, hộp 50 gói.

Bảo quản: giữ trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Cơ sở.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thày thuốc.

CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MERIPHAR-AUSTRAPHARM
Pô III-18 Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 06 năm 2013

CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MERIPHAR-AUSTRAPHARM
S.G.C.C.N: 4109020205 Póng Giám đốc
CÔNG TY
LIÊN DOANH
DƯỢC PHẨM
MERIPHAR
AUSTRAPHARM
Tổng Giám đốc
Phó Cục trưởng
Nguyễn Văn Thành
DS. Đỗ Văn Tài