



Anginovag®

Dung dịch xịt họng

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

THÀNH PHẦN

Mỗi ml chứa:

Dequalinium clorid 1,0 mg, β -glycyrrhetic acid (Enoxolon) 0,6 mg, Hydrocortison acetat 0,6 mg, Tyrothricin 4,0 mg, Lidocain hydroclorid 1,0 mg.

Tá dược: propylen glycol, pineapple oil, natri saccharin, cồn ethanol 96° vừa đủ 1ml.

DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Dung dịch xịt họng. Hộp 1 lọ 10 ml và đầu xịt.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở miệng - họng: viêm amidan, viêm hầu họng, viêm thanh quản, viêm miệng, loét miệng, bệnh áp-tơ, viêm lưỡi.

Liều lượng và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi. Đường dùng: xịt họng.

Liều tấn công: 1-2 lần xịt cho mỗi 2-3 giờ. Liều duy trì hay phòng ngừa: 1 lần xịt cho mỗi 6 giờ.

Cách dùng: Há miệng rộng. Đặt đầu xịt vào giữa 2 môi hướng về phía vùng cần tác động (họng, miệng, lưỡi, vv... tùy trường hợp bệnh lý). Để lọ thuốc thẳng đứng, nhấn phần trên của đầu xịt từ trên xuống dưới cho đến mức chặn. Lọ thuốc được cung cấp một van định liều: mỗi lần xịt đến mức chặn giúp cung cấp liều thuốc định sẵn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Thuốc có chứa cồn ethanol 89,385% thể tích/ thể tích. Mỗi liều xịt chứa khoảng 0,075g ethanol nên có nguy cơ rủi ro với trẻ em, phụ nữ cho con bú và bệnh nhân bị bệnh gan, nghiện rượu, động kinh, chấn thương hoặc có tổn thương não. Điều này có thể làm thay đổi hoặc gia tăng tác động của các thuốc khác. Người chơi thể thao nên được thông tin về việc thuốc này có chứa thành phần có thể làm kết quả dương tính với xét nghiệm chống doping.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI HOẶC CHO CON BÚ

Chưa đủ dữ liệu về việc dùng Anginovag cho phụ nữ có thai và cho con bú. Vì vậy, không khuyên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú trừ khi đã cân nhắc lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ rủi ro.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có chứng cứ về ảnh hưởng bất lợi đến sự tỉnh táo khi lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa có tài liệu báo cáo về bất kỳ tương tác nào với các hoạt chất của Anginovag.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Với dạng dùng tại chỗ và hàm lượng thấp của các thành phần trong thuốc, chưa ghi nhận bất kỳ nguy cơ khi nuốt phải thuốc sau khi xịt họng cũng như tác dụng phụ toàn thân của các hoạt chất ngay cả của corticoid và enoxolon ở liều trị liệu được khuyến cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Các đặc tính dược lực học

Anginovag là dạng phối hợp của các hoạt chất có tác dụng kháng viêm/giảm đau và kháng sinh bổ sung và hiệp lực với nhau: Tyrothricin là một kháng sinh tại chỗ được tạo ra từ *Bacillus*, có hiệu lực đối với nhiều khuẩn gram (+). Dequalinium clorid là chất sát khuẩn và khử trùng. Có hiệu lực trên nhiều vi khuẩn, nấm men và nấm. Hydrocortison acetat là một chất kháng viêm dùng cho viêm nguyên phát và thứ phát trong giai đoạn cấp của quá trình viêm. Enoxolon là chất ức chế mạnh enzym 11-hydroxysteroid dehydrogenase. Chỉ định dùng đồng thời với hydrocortison cho thấy làm tăng hiệu lực của hydrocortison. Lidocain hydroclorid là chất gây tê tại chỗ thuộc nhóm amid. Hoạt động bằng cách ức chế dòng chảy ngược ion cần cho khởi đầu và dẫn truyền các xung thần kinh.

Các đặc tính dược động học

Dùng tại chỗ. Không cho thấy khả năng hấp thu toàn thân của bất kỳ hoạt chất nào.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Chưa ghi nhận được trường hợp quá liều.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30° C. Không dùng thuốc quá hạn ghi trên bao bì. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Tên và địa chỉ nhà sản xuất: FERRER INTERNACIONAL, S.A

Văn phòng: Gran Via Carlos III,94 - 08028 BARCELONA - Tây Ban Nha

Nhà máy: Joan Buscallà, 1-9 - 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Tây Ban Nha