

# YuhanAntiphlamine S Lotion

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn in trên bao bì.

**THÀNH PHẦN :** Mỗi chai (100ml) có chứa:

**HOẠT CHẤT :**      Methyl salicylate    20g  
                                  L-Menthol                6g

**Tá dược :** Lanolin lỏng, Paraffin nhẹ lỏng, Sorbitan monostearat, Polyoxyethylene sorbitan monostearat (Polysorbate 60), Triethanolamin (Trolamin), Carbomer 941, Nước tinh khiết.

**MÔ TẢ :** Chất lỏng đồng nhất màu trắng có mùi tinh dầu bạc hà

**DUỢC LỰC HỌC/DƯỢC ĐỘNG HỌC :**

Dược lực học :

Methyl salicylat và Menthol là hai chất có tác dụng giảm đau. Thoa kem lên chỗ đau và xoa bóp kỹ.

Những hoạt chất của thuốc sẽ thẩm nhanh và làm dứt cơn đau.

Dược động học :

Hai hoạt chất Methyl Salicylat và L-Menthol được hấp thu qua da rất dễ dàng, thẩm thấu nhanh lên vùng bị đau.

**CHỈ ĐỊNH :**

Thuốc được dùng để giảm đau hoặc chống viêm trong những trường hợp sau:

- 1) Bong gân, thâm tím, đau cơ, đau khớp, đau do gãy xương, đau lưng, đau vai, đau dây thần kinh, đau do thấp khớp.
- 2) Côn trùng cắn.
- 3) Sưng đau do lạnh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG :**

Bôi một lượng thích hợp vào vùng da cần điều trị 1~4 lần/ngày  
Mát-xa nhẹ nhàng sau khi bôi thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

- 1) Tránh thoa thuốc vào mắt, vùng quanh mắt và màng nhầy.
- 2) Không thoa lên vùng da bị viêm do eczema, vùng da bị trày xước và vùng da mẫn cảm.

**CÁC CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG :**

Thuốc cần được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân sau:

- 1) Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thuốc hoặc mỹ phẩm (ví dụ, viêm da do phát ban, ngứa, ..).
- 2) Bệnh nhân và người nhà của họ có thể trạng dị ứng.
- 3) Bệnh nhân bị vết xước và vết thương hở.
- 4) Bệnh nhân đang được điều trị bệnh dưới sự giám sát của bác sĩ.
- 5) Bệnh nhân bị tiêu đường hoặc rối loạn tiêu hóa.
- 6) Trẻ em dưới 12 tuổi.

Các thận trọng chung

- 1) Dùng đúng liều và đúng cách.
- 2) Nếu trẻ em cần phải dùng thuốc, phải có sự giám sát của người lớn.
- 3) Sau 5~6 ngày dùng thuốc, nếu các triệu chứng không cải thiện, ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.