

ANTOT[®] IQ

■ **TRÌNH BÀY:** Hộp 20 ống uống x 10 ml

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi ống 10 ml chứa:

Đạm men bia thủy phân.....200 mg
Lysin hydroclorid.....100 mg
Cholin bitartrat.....50 mg
Các thành phần nguyên liệu, phụ gia khác: Nước tinh khiết, Đường trắng, Caramen (INS150a), Vanillin (tổng hợp), Dầu chuối (tổng hợp), Chất điều chỉnh độ acid (INS 524 hoặc INS 507).

Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản

■ **CÔNG DỤNG:**

ANTOT[®] IQ cung cấp các Acid amin và Cholin:

- Bồi bổ cơ thể, giúp bảo vệ và phục hồi sức khỏe, nâng cao sức đề kháng.
- Giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng hấp thu, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao thể trạng của trẻ em trong thời kỳ phát triển.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

■ **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

- Trẻ em biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng; trẻ em đang trong thời kỳ dưỡng bệnh; trẻ em cần nâng cao thể trạng trong thời kỳ phát triển.
- Người làm việc quá sức, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, người gầy yếu.
- Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Lưu ý:

- Không dùng sản phẩm khi ống không còn nguyên vẹn; bị nứt, gãy hoặc có dấu hiệu khác thường.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

■ **LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

* **Trẻ em dưới 2 tuổi:** sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ.

* **Trẻ em từ 2 - 6 tuổi:** uống 1 ống/lần.

* **Trẻ em từ 6 - 12 tuổi:** uống 1 ống/lần x 2 lần/ngày.

* **Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn:** uống 1 - 2 ống/lần x 2 lần/ngày.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh đổ vỡ.

■ **HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Traphaco 

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-24) 36810724 Fax: (84-24) 36811542


Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**


Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

CNC30TNT110TPBVSK

HƯỚNG DẪN CÁCH BỎ ỐNG THUỐC



Miếng nhựa dùng để bịt đầu ống



Cầm nghiêng ống,
kẹp miếng nhựa để
bịt đầu ống thứ nhất.



Kẹp miếng nhựa
để bịt đầu ống tiếp
theo, dung dịch sẽ
chảy vào ly.