

11/1/2

<https://trungtamthuoc.com/>

QUỐC VỆ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

1. Nhận hộp

SBK/REG No:
Thuốc tiêm tĩnh mạch APHANAT

Rx Thuốc bán theo đơn

GMP - WHO

Thuốc tiêm tĩnh mạch APHANAT

Ngày đầu: 08 / 11 / 13

L-Ornithin L-Aspartate... 1000 mg

Hộp 2 vỉ x 5 ống



PT

2. Nhận ống

Thành phần: Mỗi ống 5ml chứa:
L-Ornithin L-Aspartate... 1000 mg
Tá dược: ...vũ 5ml
Chỉ định, Liều dùng và cách dùng, Thận trọng, Chống chỉ định, Tác dụng phụ:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Bảo quản dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS


Rx Prescription drug

GMP - WHO

APHANAT Injection for I.V

L-Ornithin L-Aspartate... 1000 mg

Box of 2 blisters x 5 ampoules



APHANAT Injection for I.V

Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:



Thuốc tiêm tĩnh mạch
APHANAT
L-Ornithin L-Aspartate... 1000 mg
Số lô SX:
HD:
XNDP-120-ARMEPHACO, JSC

CÔNG TY CP ARMEPHACO - XN DƯỢC PHẨM 120
118, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0436740056 - 069525024
Website: Armephaco.com.vn

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

ĐƠN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC TIÊM APHANAT

THÀNH PHẦN

L-Ornithin L-Aspartat.....1000 mg
Tá dược vd5 ml
(Tá dược gồm: Natri metabisulfit, nước cất pha tiêm).

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch tiêm tĩnh mạch.

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ x 5 ống, kèm đơn hướng dẫn sử dụng.

DƯỢC LÝ HỌC:

L-Ornithin L-Aspartat là một phức hợp muối kép, khác với thuốc chỉ chứa L-Ornithin thông thường, khi vào cơ thể hợp chất này phân ly thành hai acid amin là L-Ornithin và L-Aspartat. Hai acid này là nguyên liệu tham gia vào chu trình urea và quá trình tổng hợp glutamin. Sự tổng hợp glutamin ở nội bào nguyên vẹn là phương tiện rất hiệu quả trong việc điều chỉnh lượng amoniac đi vào chu trình tổng hợp urea. Do đó, sự phối hợp L-Ornithin và L-Aspartat có tác dụng tương hỗ trong tổng quá trình làm giảm nồng độ amoniac (amoniac trong máu được sinh ra do phân huỷ protid, gan có nhiệm vụ biến máu thành urê). Ngoài ra, Ornithin và Aspartat còn gián tiếp tham gia tạo ra năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp urea và kích thích sự hoạt động các chức năng khác của gan. Đặc biệt chức năng chuyển hoá mỡ và tái tạo nhu mô gan. Đây là chức năng quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ và điều trị viêm gan.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

L-ornithin L-aspartat không bị đào thải chút nào dưới dạng này mặc dù dạng ure của nó lại bị đào thải trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH :

Hỗ trợ điều trị bệnh gan cấp tính hoặc mạn tính (Viêm gan, di chứng của viêm gan, rối loạn chức năng gan, tổn thương nhu mô gan, xơ gan).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc
Suy thận nặng(Nồng độ creatinin huyết tương trên mức 3mg/100ml)

THẬN TRỌNG

1.Thận trọng: Cần thận khi bẻ ống nếu không những mảnh vụn thủy tinh có thể lẫn trong thuốc gây ra những tác dụng không mong muốn.

Đặc biệt thận trọng ở trẻ em và người già.

2.Thuốc nên được tiêm chậm bằng đường tĩnh mạch.

THỜI KỲ MANG THAI, CHO CON BÚ

Độ an toàn của thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được xác định. Do đó chỉ nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật sự cần thiết.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều khởi đầu là 1 ống/ngày, dùng trong 1 tuần. Liều này có thể được dùng trong 1 đến 2 tuần tiếp theo. Sau đó những tuần khác cần giảm liều xuống 500mg (1/2 ống/ngày).

TÁC DỤNG PHỤ

Cảm giác rất bồn g ở thanh quản hoặc buồn nôn có thể xảy ra.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc"

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Chưa có báo cáo về quá liều. Trong trường hợp dùng quá liều nên thông báo ngay cho bác sĩ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

**ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120
118A, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà nội
ĐT: 04.36740056 – 069.575024**



**PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh**



P