

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc : **ARNION**

Dạng thuốc : **VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG**


Hàm lượng cho 1 viên:

Sulbutiamin 200 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên vỉ 10 viên nén bao đường:



* Nhãn trên hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao đường (bổ sung lần 1):



* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bổ sung lần 1):**



ARNION

CÔNG THỨC:

Sulbutiamin 200 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Lactose, tinh bột sắn, PVP K30, sodium starch glycolat, magnesi stearat, đường trắng, talc, gôm arabic, PVA, titan dioxyd, màu erythrosin lake, màu cam E110, sáp carnauba, parafin rắn, gelatin, nipagin, PEG 6000).

DẠNG BÀO CHẾ:

Viên nén bao đường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 6 vỉ x 10 viên.

TÍNH CHẤT: Arnion với thành phần hoạt chất chính là sulbutiamin. Sulbutiamin là phân tử có cấu trúc được biến đổi từ nhân thiamin có tác dụng làm giảm suy nhược thần kinh, bệnh nhân sẽ cảm thấy giảm mệt mỏi, căng thẳng, đỡ đau đầu, giấc ngủ sẽ được cải thiện hơn khi dùng thuốc này. Do đó, hội chứng suy nhược thần kinh được thuyên giảm rõ rệt, trí nhớ được cải thiện rõ ràng.

Khả năng hòa tan trong lipid làm cho thuốc được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và qua được hàng rào máu não. Sau khi uống thuốc, nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 1 đến 2 giờ. Thời gian bán hủy trong khoảng 5 giờ. Thuốc được đào thải qua thận.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các bệnh do thiếu thiamin. Suy nhược thần kinh, viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi.

Các triệu chứng của Hội chứng Wernicke – Korsakoff: lú lẫn, rối loạn điều khiển, rung giật nhãn cầu,...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với thiamin và một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG: Chưa tìm thấy tài liệu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Phụ nữ có thai: Không có nguy cơ nào được biết.

Phụ nữ cho con bú: mẹ dùng thuốc vẫn tiếp tục cho con bú được.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các phản ứng có hại của thuốc rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng: ban da, ngứa, mề dáy.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Khi sử dụng quá liều, có thể bị kích động kèm theo sáng khoái và rung đầu chi. Các triệu chứng này chỉ tạm thời và qua nhanh không để lại di chứng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống Arnion 2 viên/ ngày, uống 1 lần trong bữa ăn sáng. Trong trường hợp nặng có thể tăng liều 3 viên/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3895008

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



KẾ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Ngọc Diệp