

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Thuốc kháng virút dùng tại chỗ.

AROTABIN Kem bôi da

(Acyclovir)

SĐK: VD-18560-13

■ THÀNH PHẦN

Mỗi tuýp 5g chứa:

Hoạt chất:

Acyclovir 250mg

Tá dược:

Cetosteryl alcohol, Vaselin, Parafin lỏng, Polyoxyl -20-cetostearyl ether, Propylen glycol, Methylparaben, Propylparaben, Nước tinh khiết.

■ DẠNG BÀO CHẾ

Kem bôi ngoài da.

■ CHỈ ĐỊNH

Điều trị những trường hợp nhiễm virút *Herpes simplex* và *Varicella-zoster*.

■ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

AROTABIN nên được dùng 5 lần mỗi ngày, cách nhau khoảng 4 tiếng, bỏ qua liều ban đêm. Bôi thuốc vào vùng da bị tổn thương hoặc sắp bị tổn thương càng sớm càng tốt, ngay sau khi có dấu hiệu bị nhiễm virút. Nên dùng thuốc liên tục 5 ngày. Nếu tổn thương không lành sau 5 ngày, nên dùng thuốc thêm 5 ngày nữa.

■ CHỐNG CHÍ ĐỊNH

Không dùng thuốc cho những bệnh nhân bị quá mẫn với acyclovir.

■ THẬN TRỌNG

Không có lưu ý đặc biệt gì khi dùng thuốc AROTABIN bôi ngoài da.

■ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ nên dùng acyclovir cho người mang thai khi lợi ích của việc điều trị hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra với bào thai.

Chưa được biết Acyclovir bôi ngoài da có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Hấp thu toàn thân sau khi bôi là rất nhỏ.

■ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Amphotericin B và Ketoconazol làm tăng hiệu lực chống virus của acyclovir.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Cảm giác rát bỏng hoặc như bị kim châm có thể xảy ra thoáng qua sau khi dùng AROTABIN.

Một vài bệnh nhân bị nỗi ban hoặc bị khô và tróc da nhẹ.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

■ SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Cho đến nay chưa có triệu chứng quá liều nào được ghi nhận khi dùng acyclovir đường bôi ngoài da.

■ BẢO QUẢN

Giữ thuốc trong hộp kín, nơi khô mát, ở nhiệt độ dưới 30°C.

■ THỜI HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

■ ĐÓNG GÓI

1 tuýp (5g)/ hộp.

Sản xuất theo nhượng quyền của:

DAEWOO PHARM. CO., LTD.

Tại: CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

25, đường số 8, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore,

Thuận An, Bình Dương.