

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

ASCINAS 50

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Đề xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nén bao phim tan trong ruột Ascinas 50 chứa:

Thành phần dược chất: Aescin (Escin) 50mg

Thành phần tá dược: crospovidon, magnesi oxid, mannitol, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, magnesi stearat, aerosil, HPMC, PEG 400, eudragit L 30 D-55, talc, oxid sắt đỏ, natri hydroxyd.

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén tròn, bao phim màu hồng, hai mặt khum - trơn.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị suy tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạn tính ở người trưởng thành với triệu chứng như nặng chân, đau chân, chuột rút, sưng.

Phòng và điều trị tụ máu chống viêm, chống phù nề sau phẫu thuật và chấn thương.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Cách dùng

Ascinas 50 được dùng bằng đường uống. Nuốt nguyên viên với nước, không được nhai hay nghiền viên.

Uống trong bữa ăn hoặc ngay sau khi ăn.

Liều dùng

- Người lớn: 1 viên x 2 lần/ngày.
- *Bệnh nhân suy thận*: Đối với bất kỳ các loại thuốc nào, cần thận trọng ở những bệnh nhân suy thận nặng.
- *Bệnh nhân suy gan*: Đối với bất kỳ các loại thuốc nào, cần thận trọng ở những bệnh nhân suy gan nặng.
- *Người cao tuổi*: Không cần điều chỉnh liều.
- *Trẻ em và vị thành niên dưới 18 tuổi*: An toàn và hiệu quả của thuốc trên bệnh nhân dưới 18 tuổi chưa được thành lập. Vì vậy không khuyến nghị dùng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Cần có sự chăm sóc y tế khi:

Triệu chứng kéo dài hoặc dai dẳng lâu hơn 2 tuần.

Không nên dùng thuốc này khi bệnh nhân bị loét tiến triển chi dưới do suy giãn tĩnh mạch chưa được điều trị loét tĩnh mạch.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: Dữ liệu nghiên cứu trên động vật chưa đầy đủ và còn thiếu kinh nghiệm trong sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, vì vậy không khuyến nghị dùng thuốc trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ cho con bú: Tính an toàn sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú chưa được đánh giá, vì vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không có ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

Dữ liệu về tương tác thuốc còn giới hạn.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)

Không thường gặp ($1/1000 \leq \text{ADR} < 1/100$)

- Tiêu hóa: nôn, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy

- Da: ngứa, phát ban và mề đay

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng

Chưa có trường hợp nào quá liều được báo cáo. Khi quá liều, bệnh nhân có thể gặp tác dụng không muốn nhưng với mức nặng hơn.

Cách xử trí

Điều trị quá liều bao gồm điều trị triệu chứng và nâng đỡ.

THÔNG TIN VỀ DƯỢC LÝ, LÂM SÀNG

Đặc tính dược lực học

Mã ATC: C05CA07

Chưa có thông tin về dược lực học.

Đặc tính dược động học

Chưa có thông tin về dược động học.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:



Sản xuất bởi:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ – CHI NHÁNH NHÀ MÁY
USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM

Tel: (028) 37.547.997 Web: www.duocphongphu.com.vn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc

Thái Nhã Ngôn