

Aspartam OPC

GMP-WHO

ĐƯỜNG ĂN KIÊNG
DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG



Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: /ATTP-XNQC Ngày
Ngày..... in tài liệu. Tài liệu có 2 trang, thông tin sản phẩm xem ở trang 2



OPC PHARMA

1

Aspartam OPC



THÀNH PHẦN: Cho 1 g.

Aspartam (35 mg), lactose, dioxyd silic vô định hình (551).

CÔNG DỤNG: Dùng cho người bệnh tiểu đường

CÁCH DÙNG: 1 gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy khẩu vị của mỗi người.

LƯU Ý: Aspartam sẽ bị mất vị ngọt khi nấu nướng kéo dài ở nhiệt độ trên 120 °C. Tốt hơn nên hấp cách thủy hay rắc vào bánh vừa nướng chín. Không dùng cho các đối tượng bất dung nạp lactose.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.



GMP-WHO



Điện thoại liên hệ
1800 5555 18

Để biết thêm thông tin sản phẩm
Vui lòng liên hệ số điện thoại:
028. 38 77 88 99



Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC-SỐ 09/ĐX04-TH, TỐT 7, ẤP TÂN HÓA, XÃ TÂN VINH HIỆP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM. ĐT: 37517111. Fax: 38752048
Website: www.opcpharma.com Email: info@opcpharma.com

2