TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cao lỏng

A.Tichmau

Điều Kinh

THÀNH PHẦN:

Cao ích mẫu ..... 533,33 mg
(Herba Leonuri japonici extract)
(Tỉ lệ 10:1)
Cao hương phụ ..... 166,66 mg
(Rhizoma Cyperi extract)
(Tỉ lệ 10:1)
Cao ngải cứu ..... 133,33 mg
(Herba Artemisiae vulgaris extract)
(Tỉ lệ 10:1)
Tá dược vừa đủ 1 ống
(Đường trắng, Sucralose, Ethanol 96%, Acid hypophosphorous, Natri bicarbonat, Acid citric, Sorbitol 70%, Methyl paraben, Propyl paraben, Propylen glycol, Hương vanilin, Màu caramen, Nước tinh khiết).

TÁC DỤNG:

Hoạt huyết, điều kinh.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị:
- Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, bế kinh, vô kinh, vòng kinh dài, ngắn.
- Rối loạn kinh nguyệt, các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu gắt, đau bụng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml.
Cách dùng:
Uống thuốc sau bữa ăn với nước ấm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Chưa thấy báo cáo các trường hợp cần thận trọng khi dùng.
- Thành phần thuốc chứa methyl paraben và propyl paraben, có nguy cơ gây phản ứng dị ứng.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Phụ nữ có thai không được dùng thuốc này.
- Chưa xác định được thuốc có được bài tiết vào sữa mẹ không, nên cẩn thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kì cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Ở liều điều trị, thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa thấy tác dụng phụ không mong muốn.
THÔNG BÁO NGAY CHO THẦY THUỐC NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 20 ống x 8 ml
- Hộp 30 ống x 8 ml
- Hộp 50 ống x 8 ml
- Hộp 1 chai x 120 ml

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC
KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC QUÁ HẠN DÙNG GHI TRÊN NHÃN

AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

AH1840/LI01

https://trungtamthuoc.com/