



8/11/2022

MẪU NHÃN THUỐC KEM BÔI DA AVI-O5

1. Nhãn in trực tiếp trên tuýp:




Mặt sau

Mặt trước

2. Nhãn in trên vỉ:



Mặt trước



Mặt sau



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KEM BÔI DA AVI-O₅

TrungTamThuoc.com

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: Kem bôi da AVI-O₅

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG:

- Vitamine A palmitat 0,1 g (100.000 đvqt)
- Polyoxyl 20 cetostearyl ether 1,5 g
- Alcol cetostearyl 1 g
- Nipagin 0,0075 g
- Nước tinh khiết 7,3925 g

DẠNG BÀO CHẾ CỦA THUỐC: Thuốc kem.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 20 vỉ đựng tuýp 10 gam thuốc kem.

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp dưỡng da, liền sẹo.
- Mụn cám, mụn trứng cá, mụn bọc.
- Bong lột da mặt, nứt nẻ da bụng, tay, chân.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, ĐƯỜNG DÙNG:

LIỀU DÙNG:

- Thông thường bôi da: ngày 1 đến 2 lần.
- Dưỡng da: 2 lần/ tuần.

CÁCH DÙNG:

- Xoa nhẹ lên da một lớp thuốc mỏng.

ĐƯỜNG DÙNG:

- Bôi ngoài da.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Cần thận trọng khi dùng thuốc khác có chứa vitamine A

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Neomycin, cholestyramin, paraffin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A
- Dùng đồng thời vitamin A và Isotretinoin dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều. Cần tránh dùng đồng thời hai thuốc trên như dùng vitamin A liều cao.
- Các thuốc tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Bao gồm nóng, ngứa, đau rát... do kích ứng hoặc dị ứng.
- Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÁC ĐẠC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Vitamin A là vitamin tan trong dầu rất cần cho thị giác, cho sự tăng trưởng và cho sự phát triển duy trì của biểu mô. Do đó vitamin A được dùng để điều trị các bệnh khô mắt, quáng gà. Điều trị một số bệnh về da như loét trót, mụn trứng cá, vẩy nến, bong lột, rãnh nứt da.
- Trong cơ thể các ester của vitamin A được hấp thu ở ống tiêu hóa một số retinol được dự trữ ở gan và từ đây được phóng thích vào máu dưới dạng gắn với một globulin đặc hiệu.
 - Dự trữ vitamin A trong cơ thể thường đáp ứng đủ cho nhu cầu cơ thể trong vài tháng.
 - Phân retinol tự do kết hợp với acid glucuronic và bị oxy hóa thành retinal và acid retinoic rồi được đào thải qua nước tiểu và phân cùng với những chuyển hóa khác.
 - Nồng độ bình thường của vitamin A trong huyết tương là 300-600 microgam/lit. Trong trường hợp quá liều hay ngộ độc thì nồng độ này cao hơn nhiều.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng an toàn với liều dùng, cách dùng và đường dùng theo hướng dẫn nêu trên.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến lái tàu xe và vận hành máy móc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Khi thoa thuốc quá nhiều trên da có thể gây cảm giác nóng, bỏng. Triệu chứng này sẽ mất đi khi ngưng thoa.
- Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ phải ngưng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

CÁC ĐÁU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO:

- THUỐC DÙNG NGOÀI
- ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT PHÚC
155A Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710.3834295; FAX: 0710.3730513