



Axcel[®] UREA CREAM

Thành phần:

Mỗi tuýp 20g chứa:

Hoạt chất: Urea 2g

Tá dược: Dehydag wax "Q", Emulgin B, Liquid Paraffin, White Soft Paraffin, Chlorocresol, Natri Dihydrogen Phosphat, Perfume fragrance, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế:

Kem bôi da.

Được lục học:

Urea có tác dụng làm mềm da và giúp cho da luôn giữ được độ ẩm nhất định. Cơ chế tác dụng của urea là làm gãy các liên kết hydro bình thường của protein sừng, thông qua tác dụng hydrat hóa và tiêu keratin, thúc đẩy sự tróc vảy ở lớp sừng trong những trường hợp da bị sừng hóa và khô da (bệnh vẩy cá).

Được động học:

Urea rất ít hấp thu qua da khi dùng thuốc bôi ngoài da. Urea hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và bài xuất nguyên dạng qua nước tiểu.

Chỉ định:

Thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh vẩy cá, còn được gọi là bệnh tăng sừng ở da và các trường hợp da khô nứt, tạo vẩy và ngứa như:

- Viêm da do tiếp xúc với chất kích ứng, chất tẩy rửa, xà phòng hoặc các hóa chất có tính kiềm cao.
- Chàm dị ứng cấp và mạn tính.
- Chàm ở trẻ em.
- Chứng da ngứa, khô và nứt nẻ vào mùa đông.

Lưu lượng và cách dùng:

Bôi kem lên vùng da bị bệnh 2-3 lần mỗi ngày.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Tránh dùng khi da bị sưng tấy, vết thương có rỉ dịch.

Tác dụng không mong muốn:

Kem urea thường dung nạp tốt khi dùng bôi ngoài da. Đôi khi có thể gặp cảm giác đau nhức và bỏng rất đặc biệt trên da nhạy cảm. Ban đỏ, ngứa, phù có thể xảy ra.

Thận trọng:

Không được uống, chỉ dùng ngoài. Tránh tiếp xúc với mắt và niêm mạc, nếu xảy ra kích ứng phải ngừng dùng thuốc. Thuốc có chứa chlorocresol có thể gây ra dị ứng, do đó nên thận trọng khi dùng.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có thông tin về ảnh hưởng của Urea khi dùng tại

chỗ trên phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi lợi ích vượt trội những nguy cơ có thể xảy ra.

Quá liều:

Quá liều khi dùng kem urea bôi ngoài da thường như không xảy ra do urea hấp thu rất ít qua da. Tuy nhiên khi vô tình nuốt phải kem urea có thể gây ra kích ứng niêm mạc dạ dày, buồn nôn và nôn có thể xuất hiện. Lúc đó cần xử trí điều trị triệu chứng ngay lập tức. Khi bôi thuốc quá liều có thể gây kích ứng da, khi đó cần phải rửa sạch kem thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

Tương tác thuốc:

Urea có thể làm tăng tác dụng của các thuốc bôi ngoài da khác như 5-fluorouracil và dithranol, và làm tăng khả năng giải phóng thuốc và thẩm thấu qua da của các thuốc bôi ngoài da khác như corticosteroid.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng.

Để xa tầm với của trẻ em

Hạn dùng:

3 năm kể từ ngày sản xuất

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 20g.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

MAL19972556X

Số đăng ký: VN-21306-16

Nhà sản xuất

KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD.

Địa chỉ: No.1, 2 & 3, Jalan TTC 12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka, Malaysia.

Tel: + 606 336 2222