

4008-368-13

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 18/01/2013

Mẫu nhãn hộp 30 gói x gói 2g : Bailuzym - Zn
Kích thước : 110 x 50x 80 mm
Màu sắc : như mẫu

Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2g

Lactobacillus acidophilus 10¹⁰ CFU
5,0 mg

Bailuzym - Zn

Bailuzym - Zn

Lactobacillus acidophilus 10¹⁰ CFU
5,0 mg
Zinc

30 powder sachets x 2g

HASAN

HASAN - DERMAPHARM JSC HANGUO CO., LTD.
Lot 8, Dong An Industrial Park, Binh Duong Province, Vietnam

Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2g

Lactobacillus acidophilus 10¹⁰ CFU
5,0 mg

Bailuzym - Zn

Bailuzym - Zn

Lactobacillus acidophilus 10¹⁰ CFU
5,0 mg
Kẽm

Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2g

HASAN

CITY TNHH LÊN DẠNH HASAN - DERMAPHARM
Lô 8, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Số Đ. SX - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp. Date:



Mẫu nhãn gói 2g : Bailuzym - Zn
Kích thước : 70 x 50 mm
Màu sắc : như mẫu



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hương



140 x 200 mm



TỔNG CỬA HÀNG
ĐC: Quận Bình Hưng

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bailuzym - Zn

Gói 2 g thuốc bột

Thành phần

Lactobacillus acidophilus.....	10 ⁷ CFU
Kẽm gluconat.....	20,0 mg
(Tương đương.....)	5,0 mg kẽm)
Tá dược.....	và đủ tá dược

(Lactose, Saccharose, Aerosil, Bột hương vị dâu, Magnesi stearat)

Tính chất: Thuốc bột dạng hạt nhỏ màu hồng nhạt, đồng nhất, vị ngọt, mùi thơm.

Cơ chế tác dụng

- Lactobacillus acidophilus là một trực khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa bằng cách cải thiện hệ vi sinh của đường ruột.
- Cơ chế tác động của Lactobacillus acidophilus: Sinh ra acid lactic, tạo môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm gây bệnh, kể cả vi khuẩn thời rữa. Đồng thời còn kích thích miễn dịch không chuyên biệt của niêm mạc, tăng tổng hợp IgA làm tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể con người.
- Ngoài ra, trong Bailuzym - Zn còn bổ sung kẽm gluconat. Kẽm là yếu tố khoáng vi lượng thiết yếu cho sức khỏe, sự phát triển cơ thể, cũng như hệ miễn dịch của người lớn lẫn trẻ em.
- Tác dụng hỗ trợ của kẽm trong điều trị tiêu chảy: Cải thiện sự hấp thu nước và chất điện giải tại niêm mạc ruột, phục hồi enzym đường ruột, tăng miễn dịch tế bào và dịch thể giúp nhanh chóng phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cho những đợt sau.

Chỉ định

- Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch trong các trường hợp:
- Tiêu chảy do nhiễm khuẩn, do kháng sinh và hóa trị liệu.
- Viêm ruột cấp tính hay mạn tính.
- Rối loạn tiêu hóa: chướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Rối loạn cân bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch.
- Dự phòng các biến chứng đường tiêu hóa.

Liều dùng và cách dùng

- Liều dùng:**
- Liều thông thường:
 - Người lớn, trẻ em > 15 tuổi: 1 gói x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 11-15 tuổi: 1 gói x 2 lần/ngày.
 - Trẻ em 8-11 tuổi: 1/2 gói x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 5-8 tuổi: 1/3 gói x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 3-5 tuổi: 1/4 gói x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 1-3 tuổi: 1/5 gói x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 3 tháng-1 tuổi: 1/10 gói x 3 lần/ngày.
 - Tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.
 - Táo bón: 6 gói/ngày.
 - Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

- + Liều dự phòng: 2 gói/ngày.
- + Liều điều trị: 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chứng bệnh.

Cách dùng: Pha trong nước đun sôi để nguội hoặc sữa, nước hoa quả. Tốt nhất là uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.

Chống chỉ định

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng

- Sau 2 ngày điều trị mà vẫn tiêu chảy, cần khám lại.
- Người sốt cao chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Tương tác thuốc

Bailuzym - Zn ngăn cản sự hấp thu của tetracyclin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa ghi nhận tác dụng phụ.

Tác dụng khi lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống 1 liều > 40 mg/ngày: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp.
- Dùng liều lớn trong thời gian dài làm suy giảm chức năng miễn dịch và thiếu máu.
- Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xỉu), bệnh vẩy da (vàng mắt hay da), phù phổi (đau ngực hay khó thở), ăn mòn và viêm màng nhầy miệng và dạ dày, loét dạ dày cũng đã được báo cáo.
- Cần tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày.
- Nấm sử dụng chất làm dịu triệu chứng viêm như sữa, các chất carbonat kiềm, than hoạt và các chất tạo phức chelat.

Trình bày: Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2 g.


Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nội bộ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

- Không dùng thuốc quá hạn sử dụng trên bao bì.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

