

Basdène® 25 mg <https://trungtamthuooc.com/>

Benzylthiouracile
comprimé

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Benzylthiouracile 25 mg
Excipients : Amidon prégélatinisé, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, talc pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé, boîte de 50.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
ANTITHYROÏDIEN DE SYNTHÈSE

TITULAIRE DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT

BOUCHARA-RECORDATI

70, avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX - FRANCE

FABRICANT

Lab BOUCHARA-RECORDATI - 03410 SAINT-VICTOR - FRANCE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas d'hyperthyroïdie (sécrétion excessive de la glande thyroïde).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Certains cancers de la thyroïde,
- Affections sanguines graves préexistantes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'apparition de fièvre, d'angine ou de toute autre infection, consultez immédiatement votre médecin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Une surveillance de la numération et de la formule sanguine est nécessaire avant traitement, puis régulièrement pendant le traitement. **EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Augmentation de l'action des antithyroïdiens de synthèse en cas d'association avec les sulfamides hypoglycémiantes, les hydantoïnes, l'iode et les iodures. **AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament peut être pris pendant la grossesse sous surveillance médicale stricte. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin. L'allaitement est à éviter en raison du passage du médicament dans le lait maternel.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Lactose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ? POSOLOGIE

La posologie est variable selon les patients. Respectez l'ordonnance de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

L'administration se fait en 3 ou 4 prises régulièrement espacées dans la journée, administrées de préférence au moment des repas.

SURDOSAGE

Toute augmentation du volume du goître doit évoquer une hypothyroïdie par surdosage.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME POUR TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Réactions allergiques : fièvre, rougeurs, douleurs articulaires, courbatures.

Baisse des globules blancs pouvant être annoncée par de la fièvre,

Ces signes imposent l'arrêt du traitement et la réalisation d'une numération des globules blancs en urgence.

- Très rarement : vascularite (maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins), glomérulonéphrite (maladie inflammatoire du rein), qui imposent l'arrêt du traitement.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Septembre 2013.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
 - Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
 - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
 - Suivez le conseil de votre pharmacien.
 - Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
 - N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
 - Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants.

Basdène® 25 mg

Benzylthiouracil
tablet

IDENTIFICATION OF THE MEDICINAL PRODUCT

COMPOSITION

Benzylthiouracil 25 mg
Excipients : Pregelatinised starch, lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, sodium croscarmellose, magnesium stearate, talc for one tablet.

PHARMACEUTICAL FORM: Tablet, box of 50.

PHARMACOTHERAPEUTIC GROUP

SYNTHETIC ANTITHYROID AGENT

NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

BOUCHARA-RECORDATI

70, avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX - FRANCE

MANUFACTURER

Lab BOUCHARA-RECORDATI - 03410 SAINT-VICTOR - FRANCE

WHEN TO USE THIS MEDICINE ?

This medicine is indicated for use in the treatment of hyperthyroidism (excessive secretion of the thyroid gland).

WARNING!

WHEN NOT TO USE THIS MEDICINE ?

This medicine must not be used in the treatment of :

- Certain cancers of the thyroid gland,
- Pre-existing, serious blood disorders.

IF IN DOUBT, YOU MUST ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

SPECIAL WARNINGS

Consult your doctor immediately if you experience a fever, sore throat or any other infection.

PRECAUTIONS FOR USE

Your blood count must be checked before treatment and at regular intervals during treatment. **IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.**