

76795

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 03/11/2016

BEGESIC
Artwork of Aluminium Tube
Pack Size: 30 g

PT

100 mm

79.82 mm



BEGESIC
Artwork of Outer Carton
Pack Size: 30 g



Size : 36 x 28.5 x 118 mm

Begesic



Thành phần

Mỗi g kem chứa:

Methyl salicylat	110 mg
Menthol	56 mg
Eugenol	14 mg

Tá dược: PEG-20 Sorbitan Sáp ong, Glyceryl monostearat, Natri lauryl sulfat, Carbomer 934, Natri hydroxid, Simethicon, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế

Kem

Chỉ định

Làm giảm đau cơ, đau do viêm khớp, côn trùng cắn và lạnh.

Liều lượng và cách dùng

Thoa lớp kem mỏng Begesic vào nơi đau hoặc vùng bị bong gân sau đó xoa nhẹ hoặc xoa bóp cho đến khi kem thẩm hoàn toàn vào da. Không nên thoa kem Begesic quá 3-4 lần mỗi ngày hoặc nên sử dụng theo hướng dẫn của Bác sĩ

Chống chỉ định

- Bệnh nhân được biết bị dị ứng với các thuốc như methyl salicylat, menthol, eugenol, aspirin, salicylat và các thành phần khác của thuốc Begesic.
- Trẻ dưới 2 tuổi trừ trường hợp sử dụng dưới sự giám sát của Bác sĩ.

Thận trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc chỉ dùng ngoài. Không được ăn.

Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt.



Không được bôi vào các vết thương ở da hoặc các vết thương hở hoặc các vùng niêm mạc.

Không được dùng gạt nóng lên vùng da đã thoa Begesic vì có thể gây sưng và bong da

Không được băng hoặc quấn chặt nơi da bị thương đã thoa kem vì có thể làm tăng sự hấp thu các thành phần hoạt chất qua da.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả và an toàn của kem Begesic ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Tác động khi lái xe và sử dụng máy móc

Chưa biết.

Tương tác thuốc

Nên lưu ý khi đồng thời có sử dụng thuốc chống đông (như warfarin), do có thể làm tăng thời gian prothrombin.

Phản ứng phụ

Trong trường hợp dùng kem thoa Begesic với một lượng lớn hoặc thoa trên vùng da rộng, có thể gây ra triệu chứng ngộ độc salycilat như nhiễu thính giác hoặc tiếng ồn trong tai, nghe khó, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, hoa mắt, đỗ mồ hôi, đau đầu, lú lẫn, hệ thần kinh trung ương, trầm cảm, v.v..

Ngoài ra, Begesic có thể gây kích ứng da ở những bệnh nhân có da nhạy cảm.

Sau khi các phản ứng phụ phục hồi, bệnh nhân nên được thông báo và ghi nhận thuốc nào nghi ngờ có khả năng gây ra phản ứng phụ để tránh sử dụng sau này.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều

Hiện tại, chưa có báo cáo nào về các triệu chứng quá liều hoặc ngộ độc của Begesic nhưng có thể khi sử dụng Begesic với một lượng lớn hoặc thoa trên một vùng da rộng sẽ gây ngộ độc salycilat. Khi dùng nhiều hơn liều khuyến cáo, nên ngưng Begesic ngay lập tức và tham vấn Bác sĩ để có những hỗ trợ hợp lý và/hoặc điều trị triệu chứng vì không có thuốc giải độc khi bị quá liều Begesic.

Bảo quản

Bảo quản dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói

Hộp carton chứa 1 tuýp nhôm 30 g.

Nhà sản xuất

Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
222 Romklao Road, Klongsampravet, Latkrabang, Bangkok 10520, Thái Lan.
Tel: (660) 2737 6717
Fax : (660) 2360 8729 31

DT



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hàng

