



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
BERMORIC α

Thành phần bào chế: cho 1viên

Loperamide Hydrochloride	1mg
berberin Clorid	50mg
Mộc hương (Radix Saussureae lappae)	100mg
Tinh bột mì (Amylum Tritici)	300mg
Talc (talcum)	75mg
Magnesi stearat (Magnesii stearas)	3mg
Nước tinh khiết	0,05ml

Chỉ định điều trị:

- Được chỉ định dùng hàng thứ 2 trong điều trị triệu chứng ỉa chảy cấp không có biến chứng ở người lớn hoặc làm giảm thể tích chất thải sau thủ thuật mở thông hồi tràng hoặc đại tràng.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: Uống 4- 5 viên lần/ngày 2 -3 lần.

- Trẻ em: Uống 1-2 viên lần/ ngày 2-3 lần.

- Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Chống chỉ định: Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, phụ nữ có thai. Khi cần tránh ức chế nhu động ruột. Khi có tổn thương gan. Khi có viêm đại tràng nặng, viêm đại tràng màng giả. Hội chứng lỵ. Bụng trướng.

Tác dụng không mong muốn: Thuốc dễ gây kích thích cơ bóp dạ con.

Hầu hết tác dụng phụ thường gặp là phản ứng ở đường tiêu hóa.

Thường gặp, tiêu hoá: Táo bón, đau bụng, buồn nôn, nôn.

Ít gặp, toàn thân: mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu. Tiêu hoá: Trướng bụng khô miệng, nôn

Hiếm gặp, tiêu hoá: tắc ruột do liệt. Da: Dị ứng

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Thận trọng: Trong thành phần của thuốc có chứa Loperamide. Cần thận trọng với những người bệnh giảm chức năng gan hoặc viêm loét đại tràng. Ngừng thuốc nếu không thấy có kết quả trong vòng 48 giờ. Theo dõi nhu động ruột và lượng phân, nhiệt độ cơ thể. Theo dõi trướng bụng.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác Liên quan đến sự hiện diện của loperamid: Tăng độc tính những thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, các phenothiazid, các thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng có thể gây tăng tác dụng không mong muốn của loperamid.



1000104679

Hatinh Pharmaceutical joint- stock Company

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai. Có thể dùng cho bà mẹ đang cho con bú nhưng chỉ với liều thấp.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

Sử dụng quá liều: Triệu chứng: Suy hô hấp và hệ thần kinh trung ương, co cứng bụng, táo bón kích thích đường tiêu hoá, buồn nôn và nôn tình trạng quá liều thường xảy ra khi liều dùng hàng ngày khoảng 60 mg loperamid.

Điều trị: Rửa dạ dày sau đó cho uống khoảng 100g than hoạt qua ống xông dạ dày. Theo dõi các dấu hiệu suy giảm thần kinh trung ương, nếu có thì cho tiêm tĩnh mạch 2mg naloxon (0,01mg/kg cho trẻ em), có thể nhắc lại nếu cần, tổng liều có thể tới 10mg.

Qui cách đóng gói: Thuốc được đóng gói ép vi PVC/Al vi 10 viên hộp 10 vi, vi 4 viên hộp 25 vi. Lọ 20 viên/hộp

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C (điều kiện bảo quản bình thường)

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906

Fax: 0393 855921



[Handwritten signature]



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



TrungTamThuoc.com