



BETACYLIC

Thuốc mỡ bôi da

CÔNG THỨC: Cho 1 tuýp 15 gam

Betamethasone dipropionate.....	0,0075g
Acid salicylic.....	0,45g
Tá dược vừa đủ.....	15g

(Vaseline, Glyceryl monostearate, Cetostearyl alcohol, Ethanol 96%).

ĐƯỢC LỰC HỌC:

- Betamethasone là một corticosteroid tổng hợp. Có tác dụng chống viêm, chống thấp khớp và chống dị ứng.
- Acid salicylic làm tróc mạnh lớp sừng da và sát khuẩn nhẹ khi bôi trên da.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Betamethasone được hấp thu dễ dàng khi dùng tại chỗ. Khi bôi, đặc biệt nếu băng kín hoặc khi da bị rách có thể một lượng được hấp thu đủ cho toàn thân. Betamethasone phân bố nhanh chóng vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và có thể tiết vào sữa mẹ với một lượng nhỏ. Các corticosteroid được chuyển hóa chủ yếu ở gan nhưng cũng cảng cả ở thận và bài tiết vào nước tiểu.
- Acid salicylic được hấp thu dễ dàng qua da và bài tiết chậm qua nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH:

Làm giảm những biểu hiện viêm của bệnh da dày sừng và bệnh da khô có đáp ứng với corticosteroid như bệnh vẩy nến, viêm da dị ứng mãn tính, viêm thần kinh da, eczema,...

CÁCH DÙNG:

Bôi một lớp mỏng lên vùng da bị nhiễm và xoa đều 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, bệnh da ở trẻ em dưới 1 tuổi, bệnh nhiễm khuẩn, bệnh da do virus: zona, herpes, thủy đậu,...
- Không dùng bôi mắt.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Có thể bị nóng, ngứa, kích ứng, khô da, viêm nang lông, tăng mọc lông, phát ban dạng mủ, giảm sắc tố, viêm da quanh miệng, dị ứng do tiếp xúc, hăm da, nhiễm khuẩn, teo da, da có vằn. Giảm chức năng tuyến thượng thận, đặc biệt với trẻ em.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Cần thận trọng khi bôi corticosteroid diện rộng hay băng kín có thể có tác dụng toàn thân.
- Nên tránh bôi thuốc lên vết thương hở hay vùng da bị tổn thương.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thận trọng khi sử dụng thuốc này.
- Không bôi thuốc lên quầng vú khi cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chỉ xảy ra khi dùng lâu dài hay dùng trên diện rộng của da có sự hấp thu và tác dụng toàn thân.

QUÁ LIỀU:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

Tuýp 15g. Hộp 1 tuýp.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
 Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam