

Viên nang cứng

BIDI – IPALVIC

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa

Ibuprofen	200 mg
Paracetamol.....	300 mg
Cafein.....	20 mg
Tá dược vđ.....	1 viên

(Tá dược: Amidon, CMC, Talc, Mg. stearat, DST)

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói:

Lọ 100 viên. Hộp 2 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Tính chất:

Bidi-Ipalvic kết hợp tác dụng giảm đau, kháng viêm, hạ sốt của Ibuprofen và Paracetamol. Ibuprofen có tác dụng kháng viêm mạnh và giảm đau nhức. Paracetamol chỉ tác dụng trên cyclooxygenase/ prostaglandin thần kinh trung ương nên không gây kích ứng, chảy máu dạ dày, ít tác động lên hệ tim mạch, hô hấp. Cafein tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây co thắt mạch máu não nhờ đó làm giảm cường độ cũng như thời gian kéo dài của các cơn đau, nhất là đau đầu. Thêm Cafein vào trong công thức giảm đau sẽ cho hiệu quả giảm đau mạnh hơn, giúp bệnh nhân giảm mệt mỏi và tinh táo hơn.

Chỉ định:

- Chữa trị triệu chứng đau nhức, cảm sốt, nhức đầu, đau răng.
- Đau do viêm xương khớp, viêm thấp khớp và chấn thương, trật khớp, giãn cơ, viêm gân.

Liều lượng và cách dùng:

- Uống thuốc sau bữa ăn.
- Uống 1 - 2 viên/ lần x 2 - 3 lần /ngày.

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi, suy gan, suy thận nặng. Suy mạch vành, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu. Người có hội chứng polyp mũi, tiền sử phù mạch và phản ứng co thắt phế quản khi dùng aspirin hay NSAID khác, loét dạ dày - tá tràng.

Thận trọng:

- Người có tiền sử loét dạ dày, tá tràng. Người bệnh tim, tăng huyết áp. Người rối loạn đông máu nội sinh hay đang dùng thuốc chống đông máu loại Coumarin.
- Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Tương tác thuốc:

- Cạnh tranh để gắn trên protein huyết tương làm tăng cường tác động của một số thuốc sau đây: Tolbutamid, Methotrexat, Phenytoin, Probenecid.
- Làm tăng tác dụng của các chất chống đông máu.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Cần thận trọng khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máy vì Ibuprofen có thể gây nhức đầu, hoa mắt chóng mặt.

Tác dụng không mong muốn:

- Thường gặp: Chướng bụng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, khó tiêu, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chuyển hoá ruột, nhức đầu, chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh.

- Ít gặp: Phản ứng dị ứng, viêm mũi, nổi mề đay, loét dạ dày tiền triền, loạn tạo máu, độc tính cho thận khi dùng dài ngày.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí:

- *Paracetamol*: Nhiễm độc có thể do dùng 1 liều độc duy nhất (trên 10 g) hoặc do uống lặp lại liều lớn Paracetamol, hoặc do dùng thuốc dài ngày. Biểu hiện: hoại tử gan và có thể gây tử vong. Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc. Methemoglobin - máu dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay. Ngộ độc nặng, ban đầu có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động và mê sảng. Tiếp theo có thể ức chế hệ thần kinh trung ương.

- *Ibuprofen*: Hạ kali máu, rối loạn nhịp tim, toan chuyển hóa, hôn mê, sốt, suy hô hấp.

- *Cafein*: hiếm khi xảy ra quá liều cafein. Triệu chứng có thể là mất ngủ, bồn chồn, kích thích nhẹ.

*** Điều trị:**

- Chẩn đoán sớm, rửa dạ dày tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống. Sử dụng N-acetyl cystein: uống hoặc tiêm tĩnh mạch nếu không có N-acetyl cystein có thể dùng Methionin để xử trí ngộ độc Paracetamol.

- Điều trị triệu chứng và hỗ trợ, rửa dạ dày, gây nôn và lợi tiểu, cho uống than hoạt hay thuốc tẩy muối. Nếu nặng: thẩm tách máu.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tel: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846