



**Không còn ho khan,
đêm an giấc ngủ.**



THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: 10 mg dextromethorphan HBr/ 5ml sirô

CHỈ ĐỊNH: ho khan do kích ứng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: 5 - 10 ml sirô (10 - 20 mg dextromethorphan HBr) mỗi 4 giờ. **Liều tối đa:** 120 mg dextromethorphan HBr/ ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: 2,5 - 5 ml sirô (5 - 10 mg dextromethorphan HBr) mỗi 4 giờ. **Liều tối đa:** 60 mg dextromethorphan HBr/ ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: quá mẫn, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi, thiếu năng hô hấp, suy hô hấp, cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT: Dextromethorphan có khả năng gây nghiện, chỉ nên sử dụng trong một thời gian ngắn và dưới sự kiểm soát y khoa đối với những bệnh nhân có xu hướng lạm dụng hoặc phụ thuộc thuốc. Thận trọng ở những bệnh nhân suy giảm chức năng gan hoặc đang dùng các chất ức chế MAO. Không sử dụng ở ho kéo dài, trẻ dưới 6 tuổi, bệnh nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose. Thận trọng trong trường hợp ho đàm đờm kể. Thuốc có thể có tác dụng nhuận tràng nhẹ. Thuốc có tá dược Methyl-Parahydroxybenzoate, có thể gây phản ứng dị ứng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: thuốc chống trầm cảm kiểu ức chế MAO, thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc ức chế hệ men cytochrome P450-2D6, amiodarone, quinidine, fluoxetine, haloperidol, paroxetine, propafenon, thioridazine, cimetidine và ritonavir.

CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng trong giai đoạn thai kỳ. Chống chỉ định trong thời kỳ cho con bú. Không sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG PHỤ: Chóng mặt, mệt mỏi. Hiếm: lạm dụng dextromethorphan, buồn ngủ, ảo giác. Quá mẫn. Buồn nôn, nôn và rối loạn dạ dày ruột.

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 1 chai thủy tinh 60 ml.

SẢN XUẤT BỞI: PT.Boehringer Ingelheim Indonesia.

Jl. Lawang Gintung No.89, Bogor, Indonesia.

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng.

MỌI THÔNG TIN SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ:

Lầu 14 - Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn,
Quận 1, Tp.HCM.

Tel: (08) 3823 6919 - Fax: (08) 3823 6916



Ngày 22/11/2011

Bisoltussin. Giải pháp cho ho khan!