


Lot No.



Exp. date

**Rx Thuốc bán theo đơn**

**BLUECEZINE**

**Thành phần**

Mỗi viên nén bao phim chứa:

*Hoạt chất:* Cetirizin dihydroclorid ..... 10 mg

*Tá dược:* Magnesi stearat, Povidon, Tinh bột ngô, Lactose monohydrat, Pregelatinized starch , Opadry Y-1-7000 white

**Các đặc tính dược lực học**

Cetirizin dihydroclorid là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ. Ở liều được lý, cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H<sub>1</sub>, nhưng hầu như không có tác dụng đối kháng serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

**Các đặc tính dược động học**

Cetirizin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hoá. Nồng độ đỉnh đo ở trạng thái cân bằng ở mức 0,3 microgam/ml, đạt được sau (1,0 ± 0,5) giờ. Sinh khả dụng đường uống không thay đổi khi dùng thuốc cùng với thức ăn. Thể tích phân bố biểu kiến là 0,50 lít/kg. Tỷ lệ liên kết với protein huyết tương là 90 -96%.

Khoảng 2/3 liều dùng được bài xuất dưới dạng không đổi qua nước tiểu. Nửa đời thải trừ huyết tương khoảng 10 giờ. Cetirizin có động học tuyến tính ở khoảng liều 5-60mg.

Thuốc vào sữa mẹ, nhưng hầu như không qua hàng rào máu-não.

**Chỉ định**

Cetirizin là thuốc kháng histamin được dùng để điều trị dị ứng

Thuốc được dùng trong các trường hợp viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng mãn tính quanh năm và chứng mày đay (sung, đỏ và ngứa da)

Cetirizin có tác dụng làm giảm các triệu chứng hắt hơi, ngứa mũi, xổ mũi và ngạt mũi, ngứa mắt, đỏ mắt và chảy nước mắt, ban ngứa ở da

**Liều lượng và cách dùng**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Liều thông thường là 10mg x 1 lần/ngày.

Bệnh nhân bị bệnh gan hoặc bệnh thận: Liều thông thường là 5mg x 1 lần/ngày.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

**Chống chỉ định**

blue  
H

- Quá mẫn cảm với cetirizin hay với các thuốc kháng histamin khác hay với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ cho con bú
- Không dùng Cetirizin cho trẻ em dưới 6 tuổi.

#### **Thận trọng**

Thận trọng khi sử dụng Cetirizin cho bệnh nhân bị bệnh gan hay thận.

Thuốc có chứa lactose, do đó cần thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp đường.

#### **Phụ nữ có thai và cho con bú**

Chống chỉ định phụ nữ cho con bú

Chỉ khi sử dụng cho phụ nữ có thai khi thực sự cần thiết

#### **Ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc**

Thuốc có thể gây ra tác dụng phụ gây ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc như đau đầu, chóng mặt.

#### **Tác dụng không mong muốn (ADR)**

*Thường gặp, ADR > 1/100*

Hay gặp nhất là hiện tượng ngứa gãi. Tỷ lệ gặp ADR phụ thuộc vào liều dùng.

Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

*Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100*

Chán ăn hoặc tăng thêm ăn, bí tiểu, đờ ỉa, tăng tiết nước bọt.

*Hiếm gặp, ADR < 1/1000*

Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm cầu thận.

#### **Tương tác thuốc**

Không nên uống rượu khi đang dùng thuốc do có thể làm các tác dụng không mong muốn tăng lên như buồn ngủ và mất khả năng tập trung.

#### **Sử dụng quá liều**

Các biểu hiện của quá liều là buồn ngủ và chóng mặt.

Khi có quá liều xảy ra, bệnh nhân cần phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, cần xem xét đến các thuốc dùng đồng thời nếu có.

Khi quá liều nghiêm trọng, cần rửa dạ dày ngay lập tức, điều trị hỗ trợ và thường xuyên theo dõi bệnh nhân

**Đóng gói:** 10 viên/vi, 2 vi/hộp và 10 vi/hộp

15/10/2021

phar  
Asia Far

**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ*

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc*

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

Sản xuất bởi

**BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. (FAB. COIMBRA)**

São Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portugal

**bluepharma®**  
Indústria Farmacêutica, S.A.



Paulo Jorge Barradas de Oliveira Rebelo  
President

