

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/10/13

Eye Drop

BLUEYE

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

**BLUEYE** Eye Drops

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

**BLUEYE**  
Eye Drop

15mL



Manufactured By  
SAMCHUNDANG PHARM.CO., LTD  
904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam Myun,  
Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Korea

**BLUEYE** Thuốc tra mắt

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

**BLUEYE**  
Eye Drop

15mL



SĐK :  
Số lô SX :  
NSX :  
HD :  
DNNK:



Sản xuất tại:  
SAMCHUNDANG PHARM.CO., LTD  
904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam Myun,  
Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc

**BLUEYE®**  
Eye Drop

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

15mL

Manufactured By  
SAMCHUNDANG PHARM. Korea



- Composition / Thành phần:  
Each mL contains / Mỗi ml chứa:  
Hypromellose ..... 3mg  
Dextran70 ..... 1mg
- Indications / Dosage & Administration / Adverse reactions & Precautions:  
Please see insert paper

Số lô SX :  
HD :

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.**

## Thuốc nhỏ mắt BLUEYE

### ■ THÀNH PHẦN:

Hypromellose.....	3 mg
Dextran 70 .....	1 mg

Tá dược: *Benzalkonium clorid, Natri clorid, Kali clorid, Natri borat, Natri hydroxyd, Acid hydrocloric, Nước tinh khiết vô trùng.*

### ■ MÔ TẢ:

Dung dịch trong suốt không màu.

### ■ DƯỢC LÝ:

#### DƯỢC LỰC HỌC:

Hypromellose và Dextran 70 kéo dài độ dính, tăng làm ẩm kết mạc và giác mạc, giúp mắt chuyển động dễ dàng hơn.

#### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hypromellose và Dextran 70 không thấm giác mạc, không vào hệ tuần hoàn qua mạch máu ở mắt.

### ■ CHỈ ĐỊNH:

Là nước mắt nhân tạo, dùng điều trị các triệu chứng khô mắt do thiếu mucin và thiếu nước mắt.

### ■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Chỉ dùng nhỏ mắt.

Nhỏ 1-2 giọt để giảm các triệu chứng kích ứng mắt, số lần nhỏ tùy theo triệu chứng.

### ■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

### ■ THẬN TRỌNG CHUNG:

Nếu bị đau mắt, thay đổi thị trường, kích ứng, xung huyết hoặc khô cứng giác mạc kéo dài hơn 72 giờ thì nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nếu bệnh nhân sử dụng kính sát tròng, nên bỏ kính ra trước khi nhỏ thuốc. Đeo kính trở lại sau khi đã nhỏ thuốc 30 phút.

Không dùng quá 30 ngày sau khi mở lọ.

Thân trong khi dùng:

Để tránh nhiễm khuẩn, không để đầu nhỏ giọt của lọ thuốc chạm vào mắt. Không nên dùng khi thấy dung dịch thuốc bị vẩn đục.

Không nên dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh nhiễm khuẩn.

### ■ TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không có.

### ■ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sản phẩm này dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### ■ TÁC DỤNG PHỤ:

Có thể xảy ra tình trạng thị lực giảm kèm theo giật mắt, chảy nước mắt hoặc mắt bị xung huyết, hoặc có thể xảy ra tình trạng quá mẫn.

\* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc .

### ■ TÁC DỤNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Khi mới dùng, thuốc có thể gây mờ mắt trong thời gian ngắn. Nếu bị như vậy, chờ đến khi nhìn thấy rõ rồi mới lái xe hoặc vận hành máy móc.

### ■ QUÁ LIỀU VÀ ĐIỀU TRỊ:

Không có

MLL

ĐÃ MỞ  
VÀO NGÀY  
.../...

.../...

.../...

■ BẢO QUẢN

Trước khi mở nắp: Bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ không quá 30°C.  
Sau khi mở nắp: Không dùng quá 30 ngày.  
Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

■ ĐÓNG GÓI: 1 lọ / hộp

■ HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất:

**SAMCHUNDANG PHARM. CO., LTD.**

904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam-Myun, Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc

*Mr. Lee*



PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Văn Thành*

