

Rx

## BỔ PHẾ NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ KĐ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

### Thành phần:

#### Công thức bào chế cho 125ml chế phẩm:

Cao lỏng dược liệu:	61,5ml	Tương đương 21,593g dược liệu bao gồm:
Bạch linh (Poria)	0,900g	Bán hạ (Rhizoma Pinelliae) 1,875g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	1,708g	Bách bộ (Radix Stemona tuberosae) 6,250g
Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)	3,250g	Phèn chua (Alum) 0,208g
Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis)	1,875g	Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,591g
Ma hoàng (Herba Ephedrae)	0,656g	Bạc hà diệp (Herba Menthae) 1,666g
Mơ muối (Fructus Armeniacae praeparatus)		1,406g
Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis)		1,208g
Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)		0,100g
Tá dược vừa đủ		125ml

Tá dược: Xanthan gum, Gừng tươi, Sucralose, Potassium sorbat, Ethanol 95%, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Sirô thuốc màu vàng nâu, mùi thơm tinh dầu bạc hà.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100ml sirô, hộp 1 lọ x 125ml sirô.

Chỉ định: - Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản.

Thích hợp với người tiểu đường, béo phì và trẻ em.

Liều dùng, cách dùng: Ngày uống 3 lần:

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 6 tuổi: mỗi lần 10ml

- Trẻ em từ 7-10 tuổi: mỗi lần 15ml.

- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: mỗi lần 20ml

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc này:

\*Các tình trạng cần trọng khi dùng thuốc: Không có

\*Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

\*Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc: Hiện chưa có tài liệu nào ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn:

Hiện tại chưa phát hiện được tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quá liều và xử trí: Hiện chưa có tài liệu thông tin.

Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất và không quá 20 ngày sau lần mở nắp đầu tiên.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS



Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: - Trụ sở chính: 415 Hàn Thuyên, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nhà máy sản xuất: Lô H10 - Khu công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tel: 02283.649408. Fax: 02283.644650

<https://trungtamthuoc.com/>  
**TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC  
CHO NGƯỜI BỆNH**

**Rx BỔ PHẾ NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ KĐ**

*Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc  
Thông báo ngay cho bác sĩ hay dược sĩ  
những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc*

**1.Thành phần, hàm lượng của thuốc**

Công thức bào chế cho 125ml chế phẩm:

Cao lỏng được liệu	61,5ml	Tương đương 21,593g được liệu bao gồm:
Bạch linh (Poria)	0,900g	Bán hạ (Rhizoma Pinelliae) 1,875g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	1,708g	Bách bộ (Radix Stemona tuberosa) 6,250g
Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)	3,250g	Mõ muối (Fructus Armeniacae praeparatus) 1,406g
Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis)	1,875g	Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,591g
Ma hoàng (Herba Ephedrae)	0,656g	Bạc hà diệp (Herba Menthae) 1,666g
Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis)	1,208g	Phèn chua (Alum) 0,208g
Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)	0,100g	Tá dược vừa đủ 125ml

Tá dược: Xanthan gum, Gừng tươi, Sucralose, Potassium sorbat, Ethanol 95%, Nước tinh khiết.

**2. Mô tả sản phẩm:** Sirô thuốc màu vàng nâu, mùi thơm tinh dầu bạc hà.

**3. Quy cách đóng gói:** Hộp 1 lọ x 100ml sirô, hộp 1 lọ x 125ml sirô.

**4. Thuốc dùng cho bệnh gì:** Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản.  
Thích hợp với người tiểu đường, béo phì và trẻ em.

**5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:** Ngày uống 3 lần:

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 6 tuổi: mỗi lần 10ml
- Trẻ em từ 7-10 tuổi: mỗi lần 15ml.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: mỗi lần 20ml.

**6. Khi nào không nên dùng thuốc này:**

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**7. Tác dụng không mong muốn:**

Hiện tại chưa phát hiện được tác dụng không mong muốn của thuốc.

**8. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:**

Hiện chưa có tài liệu nào ghi nhận.

**9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:**

Không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên. Bỏ qua liều thuốc đã quên và uống tiếp tục như bình thường.

**10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:** Hiện tại chưa có thông tin.

**12. Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:** Hiện tại chưa có thông tin.

**13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:**

- \*Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Không có
- \*Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.
- \*Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:**

Khi có những tác dụng không mong muốn hãy thông báo cho bác sĩ. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

**15. Hạn dùng:** 30 tháng kể từ ngày sản xuất và không quá 20 ngày sau lần mở nắp đầu tiên.

**16. Tên, địa chỉ, biểu tượng của cơ sở sản xuất:**



NAMHA PHARMA

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: - Trụ sở chính: 415 Hán Thuyên, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nhà máy sản xuất: Lô H10 – Khu công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tel: 02283.649408. Fax: 02283.644650