

R_x Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THUỐC HO BỔ PHẾ

TRƯỜNG BÁCH DIỆP

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tên thuốc: Thuốc ho bổ phế TRƯỜNG BÁCH DIỆP

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Thành phần hoạt chất:

Mỗi 125 ml siro chứa:

- 60 ml dịch chiết từ dược liệu tương đương với:
- Bạch linh (*Poria*) 0,900g
- Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*) 3,750g
- Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae*) 9,750g
- Tang bạch bì (*Cortex Mori albae radices*) 5,625g
- Ma hoàng (*Herba Ephedrae*) 0,656g
- Thiên môn đông (*Radix Asparagi cochinchinensis*) 1,208g
- Bạc hà (*Herba Menthae*) 1,666g
- Bách bộ (*Radix Stemona tuberosae*) 12,500g
- Bán hạ (chế) (*Rhizoma Pinelliae*) 7,500g
- Mơ muối (*Fructus Armeniacae praeparatus*) 2,813g
- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 0,591g
- Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*) 5,000g
- Tinh dầu bạc hà (*Oleum Menthae arvensis*) 0,010g
- Phèn chua (*Alumen*) 0,208g
- Menthol (*Mentholum*) 0,075g

Thành phần tá dược gồm: Đường trắng, acid benzoic, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 125 ml.

DẠNG BÀO CHẾ: Chất lỏng sánh, màu nâu vàng, mùi thơm dược liệu, vị ngọt cay, sau tê.

CHỈ ĐỊNH:

Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản, viêm họng.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Ngày uống 3 lần

*Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần uống 10 ml

* Trẻ em:

- Từ 30 tháng tuổi – 3 tuổi: Mỗi lần uống 2,5 ml

- Trên 3 tuổi– 10 tuổi: Mỗi lần uống 5 ml

Đợt dùng từ 7 – 10 ngày.

Không dùng quá 4 tuần sau lần mở nắp đầu tiên.

Lưu ý: Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Khi dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai, người suy thận, tăng huyết áp, người đái tháo đường. Thuốc này có chứa một lượng nhỏ ethanol, ít hơn 100mg/liều.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại khi gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 125 ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện tượng đục, biến màu hoặc có những dấu hiệu khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Lô M1 – đường N3 – KCN Hòa Xá – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283.670733 Fax: 0228.3671098