

Viên nang mềm

BOGANIC®

Forte

Nhuận gan - Lợi mật - Thông tiểu - Giải độc

TRÌNH BÀY: Hộp 5 vỉ; 10 vỉ x 10 viên.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

- Cao Actisô (*Extractum Cynarae scolymii*).....200 mg
(Tương đương 10 gam dược liệu Actisô)
- Cao Rau đắng đất (*Extractum Glini oppositifolii*).....150 mg
(Tương đương 1 gam dược liệu Rau đắng đất)
- Cao Bìm bìm (*Extractum Pharbitidis*).....16 mg
(Tương đương 0,16 gam dược liệu Bìm bìm)
- Tá dược (Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Sáp ong trắng, Aerosil, Dầu đậu nành, Palm oil, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt nâu, Nipagin, Nipasol, Ethyl vanillin, Nước tinh khiết).....vừa đủ

TÁC DỤNG:

Actisô (*Cynara scolymus*): chứa các dược chất chính Cynarin, các Polyphenol, đường Inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi tiểu, chống độc. Các Polyphenol có tác dụng giảm Cholesterol huyết, bảo vệ gan. Inulin cần cho người bị đái đường. Actisô được dùng để chữa: suy giảm chức năng gan, chứng vàng da, Cholesterol huyết cao, vữa xơ động mạch.

Rau đắng đất (*Glinus oppositifolius*): chứa Spergulagenin A - một Sapogenin Triterpenoid bão hòa, Trihydroxy cetone; có tác dụng lợi tiêu hóa, kháng sinh, lợi tiểu và nhuận gan.

Bìm bìm (*Pharbitis nil*): chứa Glucosid là Pharbitin, có tác dụng nhuận tràng, thông tiểu, sát trùng.

Sự phối hợp của 3 vị thuốc làm tăng hiệu lực và tác dụng:

Nhuận gan - Lợi mật - Thông tiểu - Giải độc.

- CHỈ ĐỊNH:**
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
 - Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
 - Viêm gan gây mệt mỏi, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.
 - Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do gan gây ra.
 - Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: *Liều thông thường:*

- * **Người lớn:** mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
- * **Trẻ em trên 8 tuổi:** mỗi lần 1 viên, ngày 2 - 3 lần.

- CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
 - Người bị viêm tắc mật.
 - Người tỳ vị hư hàn (phân lỏng nát hoặc tiêu chảy).

Ghi chú: Đối với người tiểu đường có thể dùng viên BOGANIC bao phim hoặc BOGANIC forte nang mềm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542
Sản xuất tại: **C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên