

BOSAMIN®

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang chứa:

Glucosamine sulfate 2KCl.....	500 mg
(tương đương Glucosamine.....)	296 mg)
Cao Boswellia serrata.....	217,4 mg
Curcumin.....	62,7 mg
(Curcumin powder 95%.....)	66,0 mg)
Cao Grape seed	10,0 mg

Tá dược: Magnesium stearate, Nang rỗng số "00"..vđ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Chỉ dùng cho người trên 18 tuổi: nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ về chỉ định và liều dùng. Bộ Y Tế khuyến cáo nên uống từ 1250mg đến 1500mg glucosamine/ngày (các dạng muối của glucosamine được quy đổi tương ứng với glucosamine), chia làm 3 lần (ví dụ sáng 1 viên, trưa 2 viên, chiều 2 viên). Thời gian dùng thuốc tùy theo từng cá thể, ít nhất dùng trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TÁC DỤNG PHỤ: Các tác dụng phụ của Bosamin thường hiếm khi xảy ra và nói chung chỉ giới hạn ở một số các rối loạn tiêu hoá thông thường.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG

- Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc dự định có thai và cho trẻ em dưới 12 tuổi vì còn ít thử nghiệm trên những đối tượng này.
- Glucosamine thuộc nhóm carbohydrate, dù không trực tiếp gây

tăng đường huyết nhưng có thể ảnh hưởng lên sự bài tiết insulin. Vì thế cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên những bệnh nhân tiểu đường.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không nên kết hợp đồng thời thuốc này với các thuốc kháng viêm, giảm đau.

QUÁ LIỀU: Thuốc không có tác dụng độc khi dùng quá liều. Tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định của bác sĩ, vì liều cao có thể gây ra những tác dụng phụ tương tự như các thuốc kháng viêm Non-steroids. Trong trường hợp quá liều, điều trị triệu chứng và điều trị nâng đỡ.

BẢO QUẢN:

Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY: Vỉ 15 viên nang, hộp 1 vỉ, 2 vỉ và 6 vỉ.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

SẢN XUẤT BỞI:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205 - Fax: 0613-566203

SĐK/VISA NO: VD-14929-11

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty sanofi-aventis Việt Nam, 10 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM,

Điện thoại: (84 8) 3829 8526, Fax: (84 8) 3914 4801.

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà-GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84 4) 3537 1835, Fax: (84 4) 3537 1841.

sanofi aventis

Because health matters