

THÀNH PHẦN

Mỗi gói thuốc bột chứa

- *Hoạt chất:* Diosmectit 3 g
- *Tá dược:* Glucose, natri saccharin, vanilin vừa đủ 1 gói.

ĐƯỢC LỰC HỌC

- Diosmectit là một loại nhôm magesi silicat thiên nhiên có cấu trúc tinh thể dyscoido từng lớp và độ nhầy cao cùng với khả năng thấm hút cao nên có tác dụng bao phủ niêm mạc tiêu hóa rất lớn.
- Diosmectit liên kết nhiều hóa trị với glycoprotein của màng nhầy làm tăng sức chịu đựng của dịch nhầy đối với các tác nhân kích thích như acid hydrocloric, các acid mật, các vi khuẩn, virus và độc tố của chúng, các tác nhân kích thích khác.
- Diosmectit không cản quang, không nhuộm màu phân, và với liều thông dụng không làm thay đổi thời gian vận chuyển sinh lý của ruột.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

- Diosmectit không được hấp thu.
- Thuốc được đào thải qua đường tiêu hóa.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị tiêu chảy cấp và mạn tính, đặc biệt ở trẻ em.
- Điều trị triệu chứng đau của bệnh thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Cách dùng:

- BOSMECT được dùng bằng đường uống.
- Uống thuốc sau khi ăn trong trường hợp viêm thực quản và cách xa bữa ăn trong các trường hợp khác.

Liều lượng:

- Người lớn: 1 gói x 3 lần/ngày, hòa tan trong nửa ly nước.
- Nếu tiêu chảy cấp tính, liều lượng có thể tăng gấp đôi khi khởi đầu điều trị.

Trẻ em:

- Trên 2 tuổi: 2 - 3 gói/ngày.
- 1 - 2 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.
- Dưới 1 tuổi: 1 gói/ngày.
- Thuốc có thể hòa trong bình nước (50 ml) chia trong ngày hoặc trộn đều trong thức ăn dạng sệt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với diosmectit hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân tắc ruột.

THẬN TRỌNG

- Uống diosmectit không phải là giải pháp bù nước. Do đó cần phải bù nước đầy đủ trong trường hợp mất nước.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Tính chất hấp phụ của diosmectit có thể thay đổi thời gian và (hoặc) sự hấp thu của thuốc khác, do đó nên uống cách xa các thuốc khác khoảng vài giờ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Có thể gây ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thể tiếp tục với liều lượng giảm.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều. Nếu xảy ra quá liều cần thông báo ngay cho bác sĩ.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 25°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói x 3,8 g.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ