





BUPIVACAINE SPINAL HEAVY 0,5% 4ml

THÀNH PHẦN:

Hoạt chất:

Mỗi ml dung dịch thuốc tiêm chứa 5 mg Bupivacaine hydrochloride.

CHỈ ĐỊNH:

Gây tê dưới màng nhện cho các trường hợp phẫu thuật (các phẫu thuật đường tiết niệu và bụng dưới, chi dưới kéo dài tới 2-3 giờ hoặc các phẫu thuật vùng bụng kéo dài 45-60 phút).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Chế phẩm được tiêm vào trong khoang trống dưới màng nhện.
Liều sau đây áp dụng cho người lớn với tầm vóc trung bình.

Gây tê dưới màng nhện cho các trường hợp phẫu thuật:

2 – 4 ml (10 – 20 mg Bupivacaine hydrochloride).

Không sử dụng quá 4 ml (20 mg Bupivacaine hydrochloride).

Thời gian tê sau phẫu thuật phụ thuộc một số yếu tố bao gồm thể tích dung dịch thuốc được sử dụng, tư thế của bệnh nhân trong khi gây tê và tư thế của bệnh nhân sau khi tiêm.

Sau khi tiêm 3ml dung dịch vào khoảng trống L3 đến L4 đĩa gian đốt sống, mức độ gây tê đạt được có thể khác nhau, tùy theo tư thế của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân ngồi sau khi gây tê, tất cả các đoạn đốt sống từ Th7-Th10 sẽ không bị tác động. Nếu tiêm vào sườn cho các bệnh nhân nằm và sau khi tiêm bệnh nhân nằm ngửa, tất cả các đoạn đốt sống từ Th4-Th7 sẽ không bị tác động. Tuy nhiên, không quan tâm đến loại thuốc gây tê tại chỗ được sử dụng, mức độ gây tê khác nhau đối với mỗi người và không thể dự đoán được trước khi gây tê.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A, Ba Lan