

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

GMP - WHO

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

(Reg.No):

Sx tại: C.T.C.P ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Manufactured by: GMP - WHO

HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

SĐK (Reg.No):

Sx tại: C.T.C.P ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

HD:

Số lô SX:

Thành phần/ Composition:
Mỗi viên nang mềm chứa/
Each softgels contains:
Vitamin A (Retinyl palmitat).....1000IU
Tá dược vđ/ Excipients q.s.f...1 viên/ 1 softgels

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng và các thông tin khác/ Indication, Contraindication, Administration-Dosage and other information: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp/ See the package insert inside

Tiêu chuẩn/ Specification:
TCCS/ Manufacturer's

Box of 10 blisters of 10 softgels

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

GMP - WHO

Busalmint

**Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/**
Keep out of reach of children.
Carefully read the accompanying instructions before use.

Bảo quản/ Storage:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/
Store in a dry place, below 30°C

SĐK (Reg.No):
Số lô SX (Lot.No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

DNT
HATAPHAR

Sản xuất tại/ Manufactured by:
CTY CP ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ HATAY PHARMACEUTICAL JSC
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Hà Nội/
Population groups No. 4 - La Khe - Ha Dong - Ha Noi

BỘ Y TẾ
TIC QUẢN LÝ DƯỢC
HÀ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 26/05/2015

7/1/20

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

(Reg.No):

Sx tại: C.T.C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Manufactured by: GMP - WHO

HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

SDK (Reg.No):

Sx tại: C.T.C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Manufactured by: GMP - WHO

HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

SDK (Reg.No):

Sx tại: C.T.C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Manufactured by: GMP - WHO

HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

HD:

Số SX:



Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

GMP - WHO

Thành phần/ Composition:
Mỗi viên nang mềm chứa/ Each softgels contains:
Vitamin A (Retinyl palmitat).....1000IU
Tá dược vd/ Excipients q.s.f.....1 viên/ 1 softgels
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/ Keep out of reach of children.
Carefully read the accompanying instructions before use.

SDK (Reg.No):
Tiêu chuẩn/ Specification:
TCCS/ Manufacturer's
Số lô SX (Lot.No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

Box of 2 blisters of 15 softgels

Busalmint

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

GMP - WHO

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng và các thông tin khác/ Indication, Contraindication, Administration-Dosage and other information: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp/ See the package insert inside
Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C/ Store in a dry place, below 30⁰C
Sản xuất tại/ Manufactured by:
CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ HATAY PHARMACEUTICAL JSC
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Hà Nội/ Population groups No. 4 - La Khe - Ha Dong - Ha Noi

Hướng dẫn sử dụng thuốc
BUSALMINT



Dạng thuốc: Viên nang mềm.

Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm, hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU
Tá dược vđ viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, butylated hydroxytoluen, nipagin, nipasol, gelatin, glycerin, vanilin, titan dioxyd, phẩm màu chocolate, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- Chỉ định:

Dự phòng và điều trị các triệu chứng thiếu vitamin A như bệnh khô mắt, quáng gà.

Bổ sung cho người bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay gan ứ mật mạn tính, thường hay thiếu hụt vitamin A.

- Cách dùng và liều dùng:

- Liều thường dùng cho người lớn và thiếu niên:

Phòng ngừa thiếu vitamin A (uống hàng ngày):

Uống 2-3 viên/ngày

Người mang thai: Uống 2-3 viên/ngày

Người cho con bú: Uống 4 viên/ngày

- Liều thường dùng cho trẻ em:

Phòng ngừa thiếu vitamin A (uống hàng ngày):

Từ khi sinh đến 3 tuổi: uống 1 viên

Từ 4 - 6 tuổi: uống 1 viên

Từ 7 - 10 tuổi: uống 2 viên

- Đối với bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay bệnh gan mạn tính có ứ mật: Thường cho người bệnh uống thêm vitamin A vì những người này thường bị thiếu hụt vitamin A.

- Chống chỉ định:

- Người bị quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Người bệnh thừa vitamin A.

- Thận trọng:

- Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa vitamin A. Uống vitamin A liều cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu: buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng, co giật, ỉa chảy.

- Phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai

Vitamin A:

Tránh dùng vitamin A hay các chế phẩm tổng hợp cùng loại như isotretinoin với liều cao cho phụ nữ có thai vì vitamin A liều cao (10.000 IU/ngày) có khả năng gây quái thai.

Thời kỳ cho con bú

Vitamin A: Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, các bà mẹ cần dùng hàng ngày 4000 - 4330 IU vitamin A.

- Tác dụng của thuốc lên người lái xe và vận hành máy móc: Cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ: buồn nôn, nôn.

Uống thuốc liều cao kéo dài có thể gây đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là: Mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sụt cân, nôn, rối loạn tiêu hoá, sốt, gan-lách to, da bị biến đổi.

rụng tóc, tóc khô giòn, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề dưới da, đau ở xương khớp. Trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính bao gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc xương dài. Hầu hết các triệu chứng mất dần khi ngừng sử dụng thuốc. Uống vitamin A liều cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu: buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng, co giật, ỉa chảy. Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống thuốc từ 6 đến 24 giờ. Đối với phụ nữ mang thai, liều Vitamin A trên 8.000IU mỗi ngày có thể gây ngộ độc cho thai nhi.

Khi thấy các triệu chứng ngộ độc phải ngừng sử dụng thuốc và xử trí theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

*** Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu A.

- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng không thuận lợi cho sự thụ thai.

- Vitamin A và isotretinoin dùng đồng thời có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều. Cần tránh dùng đồng thời hai thuốc trên như tránh dùng vitamin A liều cao.

- Sử dụng dầu khoáng quá mức có thể cản trở hấp thu.

- Quá liều và xử trí

Ngộ độc mạn tính: Dùng vitamin A liều cao kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là: mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sút cân, nôn, rối loạn tiêu hóa, sốt, gan - lách to, da bị biến đổi, rụng tóc, tóc khô giòn, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề dưới da, đau ở xương và khớp. Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính còn gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau các xương dài. Khi ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mất dần nhưng xương có thể ngừng phát triển do các đầu xương dài đã cốt hóa quá sớm.

Ngộ độc cấp: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng và co giật, ỉa chảy.... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ.

Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

*** Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"**

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai