

7/10/22

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014

Calcium 500mg
BVP
CALCIUM

CALCIUM BVP
(10 viên)
Box: 105 x 45 x 105 mm
Label: 118 x 83 mm

COMPOSITION: Calcium Lactate Gluconate 2940mg, Calcium Carbonate 300mg (equivalent to Calcium base 500mg) and excipients sq. for 1 effervescent tablet.

INDICATIONS: Calcium supplement for cases of
• Calcium deficiency due to increased demand of Calcium such as growing children, pregnancy or lactation.

• Prevention from osteoporosis for elderly, menopausal women, corticosteroid induced or other origins.

• Enhancing bone healing in fracture.

• A junctive treatment of rickets, osteomalacia.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

• Children from 6 -10 years old:

1 tablet a day.

• Adult and children from 10 years old:

2 tablets a day.

Dissolve the effervescent tablet in a glass of water to obtain a palatable solution before taken.

CONTRAINDICATIONS AND MORE OTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY

Manufacturer:

BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

Box 1 tupe x 10 effervescent tablets

**CALCIUM
BVP**
Calcium 500mg

ORAL ROUTE

WHO - GMP

BV PHARMA

THÀNH PHẦN: Calcium Lactate Gluconate 2940mg, Calcium Carbonate 300mg (tương đương Calcium 500mg) và tá dược vừa đủ một viên sủi bọt.

CHỈ ĐỊNH: Bổ sung Calci trong các trường hợp như
• Thiếu Calcium do nhu cầu phát triển như trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

• Phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, do dùng thuốc corticoid hay do mọi nguyên nhân khác.

• Tăng cường quá trình liền xương trong gãy xương.

• Điều trị hỗ trợ bệnh còi xương, nhuyễn xương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

• Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: 1 viên mỗi ngày.

• Người lớn & trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên mỗi ngày.

Hòa tan viên nén sủi bọt vào 1 ly nước để được một dung dịch thơm ngon trước khi uống.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Hộp 1 tupe x 10 viên nén sủi bọt bao phim

**CALCIUM
BVP**
Calci 500mg

THUỐC UỐNG

BV PHARMA

WHO - GMP

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:

NSX/Mfd:

BD/Exp:



10 viên nén sủi bọt bao phim

**CALCIUM
BVP**
Calci 500mg

THUỐC UỐNG

THÀNH PHẦN:

Calcium Lactate Gluconate 2940mg, Calcium Carbonate 300mg (tương đương Calcium 500mg) và tá dược vừa đủ một viên sủi bọt.

CHỈ ĐỊNH: Bổ sung Calci trong các trường hợp như

• Thiếu Calcium do nhu cầu phát triển như trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

• Phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, do dùng thuốc corticoid hay do mọi nguyên nhân khác.

• Tăng cường quá trình liền xương trong gãy xương.

• Điều trị hỗ trợ bệnh còi xương, nhuyễn xương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

• Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: 1 viên mỗi ngày.

• Người lớn & trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên mỗi ngày.

Hòa tan viên nén sủi bọt vào 1 ly nước để được một dung dịch thơm ngon trước khi uống.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN:

Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Số lô SX/Lot No.:

HD/Exp:

BV PHARMA

CALCIUM
BVP
Calcium 500mg

CALCIUM
BVP
Calcium 500mg

ORAL ROUTE

WHO - GMP

CALCIUM
BVP
Calci 500mg

Calci 500mg

CALCIUM
BVP
Calci 500mg

THUỐC UỐNG

WHO - GENEVA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV PHARMA



NSA/MIC
HD/Exp:

kich thuoc : (45x45x173) mm

20 viên nén sủi bọt bao phim

THÀNH PHẦN:

Calcium Lactate Gluconate 2940mg, Calcium Carbonate 300mg (tương đương Calcium 500mg) và tá dược vừa đủ một viên sủi bọt.

CHỈ ĐỊNH: Bổ sung Calci trong các trường hợp như:

- Thiếu Calcium do nhu cầu phát triển như trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
- Phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, do dùng thuốc corticoid hay do mọi nguyên nhân khác.
- Tăng cường quá trình liền xương trong gãy xương.
- Điều trị hỗ trợ bệnh còi xương, nhuyễn xương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 – 10 tuổi: 1 viên mỗi ngày.
 - Người lớn & trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên mỗi ngày.
- Hòa tan viên nén sủi bọt vào 1 ly nước để được một dung dịch thơm ngon trước khi uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN:

Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX/Lot No.:

HD/Exp:

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM

**CALCIUM
BVP**


Calci 500mg

THUỐC UỐNG

WHO - GMP



BV PHARMA



Viên nén sủi bọt

THÀNH PHẦN: Calci lactat gluconat 2940 mg, Calci carbonat 300 mg (tương đương Calci 500 mg) và các tá dược Acid citric khan, Natri bicarbonat, Effer soda, Povidon, Đường trắng, Mùi cam bột, Aspartam, Natri benzoat, Sacharin natri, Polyethylen glycol 6000, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ một viên nén sủi bọt.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén sủi bọt.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 10 viên, Hộp 1 tuýp 20 viên.

DƯỢC LỰC: Viên nén sủi bọt CALCIUM - BVP chứa các muối Calcium có thể ion hóa, dễ tan. Thuốc chứa hàm lượng Calci cao được dùng như một liệu pháp Calci dạng uống để điều trị các tình trạng thiếu Calci cấp hay mãn tính và các rối loạn chuyển hóa xương ở mọi độ tuổi.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Bổ sung Calci trong các trường hợp như:

- Thiếu Calci do nhu cầu phát triển như trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
- Phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, do dùng thuốc corticoid hay do mọi nguyên nhân khác.
- Tăng cường quá trình liền xương trong gãy xương.
- Điều trị hỗ trợ bệnh còi xương, nhuyễn xương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng:

- Trẻ em từ 6 – 10 tuổi: 1 viên mỗi ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên mỗi ngày.

Cách dùng: Hoà tan viên nén sủi bọt vào 1 ly nước để được một dung dịch thơm ngon trước khi uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Rung thất trong hồi sức tim. Bệnh tim và bệnh thận.
- Tăng calci huyết, u ác tính phá hủy xương, calci niệu nặng và loãng xương do bất động.
- Người bệnh đang dùng Digitalis (vì nguy cơ ngộ độc Digitalis).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Thận trọng đối với các bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng hoặc hạn chế muối, cần cân nhắc đến lượng muối trong khẩu phần hàng ngày vì trong mỗi viên thuốc có chứa khoảng 0,37g muối natri.
- Thận trọng đối với các bệnh nhân đái tháo đường, vì mỗi viên thuốc có chứa khoảng 0,42 g đường sacharose.
- Tăng cường theo dõi nơi bệnh nhân suy thận nhẹ và vừa hay bệnh liên quan tăng calci huyết.
- Tránh dùng cùng lúc với liều cao vitamin D.
- Các bệnh nhân có khả năng bị sỏi calci niệu nên uống với nhiều nước.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Vitamin D làm tăng hấp thu Calci ở đường tiêu hóa có thể làm tăng calci huyết.
- Thuốc lợi tiểu Thiazid, Clopamid, Ciprofloxacin, Chlorthalidon, các thuốc chống co giật có thể làm giảm sự thanh thải Calci có nguy cơ làm tăng calci huyết.
- Calci làm tăng tác dụng của Digitalis có thể gây ngộ độc do quá liều.
- Calci làm giảm hấp thu nhiều thuốc khác như Tetracyclin, Fluorid, Fluoroquinolon, phải dùng cách xa ra ít nhất 3 giờ.
- Các Corticosteroid, Phenytoin làm giảm sự hấp thu Calci qua đường tiêu hoá.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú khi cần thiết và theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến việc lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Quá liều Calci có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, kích thích dạ dày và tiêu chảy. Nếu dùng cùng lúc vitamin D liều cao có thể tăng calci huyết. Xử trí: Rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm:

- Chóng mặt (hạ huyết áp), giãn mạch ngoại vi.
- Rối loạn tiêu hóa như táo bón, đầy bụng, buồn nôn, nôn.
- Đau dạ dày, buồn nôn.

Ít khi bị vã mồ hôi, loạn nhịp, rối loạn chức năng tim cấp.

Hiếm khi bị huyết khối.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ


NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax: 08 - 37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

