



VỎ HỘP THUỐC CAM XANH

NHÃN LỘ THUỐC CAM XANH



Kích thước thật

CƠ SỞ ĐỒNG DƯỢC TIÊU LAN



Nguyễn Thị Hồng Liên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CAM XANH

Hộp 1 lọ 0,6 gam thuốc bột

1. **Dạng bào chế :** Thuốc bột

2. **Thành phần** (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): 0,6 gam thuốc bột

Tên nguyên liệu	Khối lượng
– Thanh đại (<i>Indigo Naturalis</i>)	0,39g (không phải ba chín gam)
– Bạch phần (<i>Alumen</i>)	0,10g (không phải một gam)
– Ngũ bội tử (<i>Galla chinensis</i>)	0,10g (không phải một gam)
– Mai hoa băng phiến (<i>Borneol</i>)	0,01g (không phải không một gam)
– Tá dược	Không

3. **Công năng - Chỉ định:**

Chữa viêm lợi có mụn mủ, ngứa nhức chân răng; sâu răng; chảy máu; cam miệng, cam mũi (sưng lợi, miệng hôi, thò lò mũi xanh).

4. **Chống chỉ định và thận trọng:**

- Không dùng cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Thuốc xát răng lợi và dùng ngoài. Không được uống.
- Khi xát răng lợi, có thể nuốt nước bọt có thuốc, nhưng không được nuốt với lượng $\geq 0,2g$ bột thuốc

5. **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** chưa có báo cáo

6. **Liều dùng, cách dùng:**

- **Viêm lợi có mụn mủ, ngứa nhức chân răng; sâu răng; cam miệng:**

- + dùng tăm bông chấm thuốc, xát, chấm, rửa thuốc vào chỗ đau viêm.
- + giữ thuốc ở chỗ đau viêm từ 15 đến 20 phút sau đó có thể nhổ đi hoặc nuốt
- + ngày 2-3 lần sau các bữa ăn, xát thuốc tốt nhất trước khi đi ngủ, để giữ thuốc qua đêm, mỗi lần dùng 0,05g đến 0,1g thuốc bột.

* Sâu răng: xát thuốc nhiều lần trong ngày.

- **Cam mũi**

- + Dùng tăm bông chấm thuốc chấm vào mũi, mỗi lần khoảng 0,05g đến 0,1g. Ngậm miệng và thở ra.



Handwritten signature in blue ink.

+ Hoặc lấy 1 lọ thuốc nhỏ mắt mũi Natri clorit 0,9% loại 10ml, đổ bỏ 1/3 hoặc 1/2 dung dịch, đổ 0,6g thuốc bột vào, lắc đều, nhỏ 2 — 3 giọt vào mũi.

+ Cách 2-3 ngày chấm hay nhỏ thuốc một lần.

- **Chảy máu (rách da nhỏ, sứt chân tay):** rắc bột thuốc lên vết rách, dùng băng băng lại.

7. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: được dùng

8. Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng

9. Tương tác với các thuốc khác, dạng tương tác khác: chưa có báo cáo

10. Quá liều và xử trí: Nếu nuốt với lượng $\geq 0,2g$ bột thuốc, sẽ gây ỉa chảy cấp tính. Xử trí: ngừng dùng thuốc, ỉa chảy sẽ hết.

Bảo quản: nơi khô ráo và mát ($\leq 30^{\circ}C$)

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: sản xuất theo TCCS

*"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc"*

Sản xuất tại: CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIÊU LAN

Địa chỉ : P6, N1, Tập thể Viện Y học cổ truyền Quân đội, tổ 11, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.38550779

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

CHỦ CƠ SỞ
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC
TIÊU LAN
CHN: 144/2008/CCTH-SYT

DS. Nguyễn Thị Hồng Liên



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng