

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 08/12/2014

Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Cách dùng - Liều dùng:

Uống vào buổi sáng và buổi tối.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.

Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHAI HÀ

Số 2A - Phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP Thái Bình

Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548

Tư vấn sử dụng: 036.3647286

Cao lỏng
125 ml

CAO ÍCH MẪU

GMP - WHO

Hoạt huyết
Điều kinh

Công thức:

Mỗi lọ 125 ml chứa các chất chiết xuất từ:

Ich mẫu 100,00 g

Hương phụ 31,25 g

Ngải cứu 25,00 g

Tá dược vừa đủ 125 ml

Công dụng:

Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.

Chỉ định:

Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau bụng, làm cho tử cung chống phục hồi sau khi sinh.

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

KT: 120x48 (mm)

OHM - dMG

CAO ÍCH MẪU

Cao lỏng
125 ml

Cao lỏng
125 ml

CAO ÍCH MẪU

GMP - WHO



Hoạt huyết
Điều kinh

CAO ÍCH MẪU

Công thức:

Mỗi lọ 125 ml chứa các chất chiết xuất từ:

Ich mẫu 100,00 g

Hương phụ 31,25 g

Ngải cứu 25,00 g

Tá dược vừa đủ 125 ml

Công dụng:

Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.

Chỉ định:

Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau bụng, làm cho tử cung chống phục hồi sau khi sinh.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai.
- Người tiểu đường.
- Người đang vận hành máy móc, lái tàu, lái xe.
- Người đang dùng thuốc có nhóm mebendazol, imidazol.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

KHAIHAPHARCO

Cao lỏng
125 ml

CAO ÍCH MẪU

GMP - WHO



Hoạt huyết
Điều kinh

CAO ÍCH MẪU

Cách dùng - Liều dùng:

Uống vào buổi sáng và buổi tối.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.

Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

Bảo quản:

Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHAI HÀ
Số 2A - Phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP Thái Bình
Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548
Tư vấn sử dụng: 036.3647286

KHAIHAPHARCO

KT: 55*55*135 (mm)

Tỉ lệ: 80%

Thái Bình, ngày tháng năm 2014

CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHAI HÀ



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Hồng Ngọc

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

180/0148



Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Cách dùng - Liều dùng:

Uống vào buổi sáng và buổi tối.
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.
Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.


Bảo quản:

Nơi khô, mát, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHAI HÀ
Số 2A - Phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP Thái Bình
Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548
Tư vấn sử dụng: 036.3647286

KT: 120x48 (mm)



KT: 46x46x116 (mm)



Thái Bình, ngày.....tháng.....năm 20.....

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHAI HÀ

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Hồng Ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAO ÍCH MẪU

1. **Dạng bào chế:** Cao lỏng

2. **Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** cho 1 chai 125 ml

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
Nguyên liệu		
1	Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonici</i>)	100,00 g (một trăm gam)
2	Hương phụ (<i>Rhizoma Cyperi</i>)	31,25 g (ba một phẩy hai lăm gam)
3	Ngải cứu (<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>)	25,00 g (hai mươi lăm gam)
Tá dược		
1	Đường trắng (<i>Saccharum</i>); Acid benzoic (<i>Acidum benzoicum</i>); Ethanol (<i>Ethanolum</i>); Nước uống được (<i>Aqua Potabilis</i>)	Vd 125 ml (vừa đủ một trăm hai lăm mililit)

3. **Công dụng - chỉ định:**

- **Công dụng:** Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.
- **Chỉ định:**

- Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau bụng, làm cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh.

4. **Chống chỉ định - thận trọng:**

- **Chống chỉ định:**
 - Phụ nữ có thai.
 - Người tiểu đường.
 - Người đang vận hành máy móc, lái tàu, lái xe.
 - Người đang dùng thuốc có nhóm mebendazol, imidazol.
 - Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

- **Thận trọng:**

- Khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú, người đang hành kinh, người huyết áp cao.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Do thuốc có ethanol nên khi uống có thể sinh đỏ mặt. Ngoài hiện tượng đó, nếu thấy bất thường khác khi dùng thuốc cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.



6. Cách dùng - liều dùng: Uống vào buổi sáng và buổi tối.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25 ml.

Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

7. Kiên cử ăn uống khi dùng thuốc:

Khi đang dùng thuốc cần kiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má, diếp cá, củ cải trắng, đồ biển như: ốc, sò, ngêu,... Không uống nước đá và tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương nên không sử dụng khi đang lái xe và vận hành máy móc.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Tương tác với nhóm thuốc mebendazol và imidazol.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

13. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

15. Trình bày: Hộp 1 lọ x 125 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Đề xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình -
Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 641 546

Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng: 0363 647 286

Thái Bình, ngày tháng năm 2013



CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Hồng Ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CAO ÍCH MẪU

1. **Dạng bào chế:** Cao lỏng
2. **Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** cho 1 chai 100 ml.

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
Nguyên liệu		
1	Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonici</i>)	80,0 g (Tám mươi gam)
2	Hương phụ (<i>Rhizoma Cyperi</i>)	25,0 g (Hai lăm gam)
3	Ngải cứu (<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>)	20,0 g (Hai mươi gam)
Tá dược		
1	Đường trắng (<i>Saccharum</i>); Acid benzoic (<i>Acidum benzoicum</i>); Ethanol (<i>Ethanolum</i>); Nước uống được (<i>Aqua Potabilis</i>)	Vđ 100 ml (vừa đủ một trăm mililit)

3. **Công dụng - chỉ định:**
- **Công dụng:** Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.
 - **Chỉ định:**
 - Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau bụng, làm cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh.
4. **Chống chỉ định - thận trọng:**
- **Chống chỉ định:**
 - Phụ nữ có thai.
 - Người tiểu đường.
 - Người đang vận hành máy móc, lái tàu, lái xe.
 - Người đang dùng thuốc có nhóm mebendazol, imidazol.
 - Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
 - **Thận trọng:**
 - Khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú, người đang có kinh, người cao huyết áp.
5. **Tác dụng không mong muốn:** Do thuốc có ethanol nên khi uống có thể sinh đỏ mặt. Ngoài hiện tượng đó, nếu thấy bất thường khác khi dùng thuốc cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.



6. Cách dùng - liều dùng: Uống vào buổi sáng và buổi tối.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25 ml.

Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

7. Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:

Khi đang dùng thuốc cần kiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má, diếp cá, củ cải trắng, đồ biển như: ốc, sò, ngêu,... Không uống nước đá và tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương nên không sử dụng khi đang lái xe và vận hành máy móc.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Tương tác với nhóm thuốc mebendazol và imidazol.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý..

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

13. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

15. Trình bày: Hộp 1 lọ x 100 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình -
Tỉnh Thái Bình.


Điện thoại: 0363 641 546

Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng: 0363 647 286

Thái Bình, ngày tháng năm 2013

CÔNG TY CPTM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Nguyễn Hồng Ngọc