

Cao lỏng Bát Trần



Cao lỏng Bát Trần

Hộp 1 chai x 100ml cao lỏng

THÀNH PHẦN:

Mỗi 100ml Cao lỏng chứa:

75g cao lỏng hỗn hợp được煎熬

tỷ lệ 1/1 tương ứng với:

Đường sắn (*Radix Codonopsis*) ... 10,0g

Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*)

..... 10,0g

Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis*

macrocephalae) 10,0g

Bạch thược (*Radix Paeoniae alba*) 10,0g

Bạch linh (*Poria*) 10,0g

Xuyên khung (*Rhizoma et Radix*

Ligustici wallichi) 10,0g

Cam thảo (*Radix et Rhizoma Glycyrrhizae*)

..... 5,0g

Thục địa (*Radix Rehmanniae preparata*)

..... 10,0g

Tà dược vĩ 100ml

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN TCCS:

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Cao lỏng Bát Trần

THÀNH PHẦN:
Mỗi 100ml Cao lỏng chứa:
75g cao lỏng hỗn hợp được煎熬
tỷ lệ 1/1 tương ứng với:
Đường sắn 10,0g
Đường quy 10,0g
Bạch truật 10,0g
Bạch thược 10,0g
Xuyên khung 10,0g
Cam thảo 5,0g
Thục địa 10,0g
Tà dược vĩ 100ml
SX bởi CT.C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Chai 100ml cao lỏng

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc kèm trong hộp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN TCCS:

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

CÔNG NANG:

Có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.

CHỈ ĐỊNH:

Khi huyết lưỡng hư có biểu hiện: cơ thể suy nhược, mặt mũi, chân ấm, ăn uống không tiêu, lưỡi nhợt, râu trắng, lưng mỏi, khí đoản, sắc mặt bệch, chóng mặt hoa mắt, tim đập hồi hộp, to sơ mạch tế nhược, không lực.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

Mỗi lần uống 5ml - 10ml x 2 lần/ ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước, tinh khiết để uống. Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai.

- Người bị miễn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI:

Không dùng.

SỬ DỤNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

Dùng được.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp thuốc.

Sản xuất tại:

CÔNG TY C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4, Phường La Khê,

Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Hà Nội

Lần đầu: 12 / 12 / 2015

Hướng dẫn sử dụng thuốc
CAO LÔNG BẮT TRÂN



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 chai x 100ml.
- **Thành phần:** Mỗi 100ml cao lỏng chứa:

75g cao lỏng hỗn hợp được liệu theo tỷ lệ 1/1 tương ứng với:	
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>)	10,0 g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	10,0 g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	10,0 g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae alba</i>)	10,0 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	10,0 g
Xuyên khung (<i>Rhizoma et Radix Ligustici wallichii</i>)	10,0 g
Cam thảo (<i>Radix et Rhizoma Glycyrrhiae</i>)	5,0 g
Thục địa (<i>Radix Rehmaniae praeparata</i>)	10,0 g
Tá dược vừa đủ	100ml

(Tá dược gồm: acid benzoic, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Công năng:** Có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.

- **Chỉ định:** Khí huyết lưỡng hư có biểu hiện: cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn, ăn uống không tiêu, lưỡi nhạt, râu trắng, lưỡi nói, khí đoản, sắc mặt bệch, chóng mặt hoa mắt, tim đập hồi hộp, lo sợ, mạch tế nhược, không lực.

- **Cách dùng và liều dùng:**

Mỗi lần uống 5ml -10ml x 2 lần/ ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống

Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc

- **Chống chỉ định:**

Phụ nữ có thai

Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** Không dùng.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** Dùng được

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** chưa có báo cáo

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* **Lưu ý:** Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường. Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

" **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"

[Handwritten signature]

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. *Nguyễn Bá Lai*



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

