

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Captogastril® stick pack

Thiết bị y tế CE 0426

CAPTOGASTRIL® là thiết bị y tế dạng bột tan trong miệng, được đóng gói trong từng gói nhỏ (stick pack), giúp làm giảm các triệu chứng do rối loạn tiêu hóa và tăng acid dạ dày như ợ nóng, trào ngược, đầy hơi, buồn nôn, khó tiêu...

ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA THIẾT BỊ Y TẾ

Nhiều yếu tố như chế độ ăn uống không cân đối, căng thẳng, điều trị thuốc kéo dài, sử dụng thực phẩm và đồ uống gây tăng độ acid, có thể dẫn đến các triệu chứng liên quan đến tăng acid dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, đầy hơi, cảm giác no tức sau ăn, trào ngược acid và ợ nóng.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

CAPTOGASTRIL® stick pack chứa **simethicone**, một chất chống tạo bọt có hoạt tính bề mặt, giúp làm giảm sức căng bề mặt của các bóng khí trong chất nhầy và dịch tiêu hóa hiện diện trong dạ dày và ruột, giúp làm vỡ các bóng khí này và ngăn ngừa sự hình thành mới. Nhờ đó, lượng khí dư thừa có thể dễ dàng được dẫn lưu và loại bỏ khỏi đường tiêu hóa.

Ngoài ra, **natri bicarbonate, magnesi carbonat và magnesi hydroxit** giúp trung hòa tình trạng tăng acid dạ dày. Bên cạnh đó, với hiệu ứng sủi dễ chịu do sự hiện diện của natri bicarbonate và acid citric, **CAPTOGASTRIL®** stick pack giúp mang lại cảm giác nhẹ bụng.

THÀNH PHẦN

Thành phần hoạt tính: simethicone (80mg), magnesi hydroxit (150mg), magnesi carbonat (100mg), natri bicarbonate (135mg)

Tá dược: xylitol, acid citric, sorbitol, hương chanh, silic dioxit, tinh dầu gừng (dùng làm hương liệu), sucralose, acesulfame K, natri saccharin.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Để hỗ trợ tiêu hóa bình thường: 1 gói sau hai bữa ăn chính, tối đa 2 gói mỗi ngày.

Để giảm tình trạng tăng acid dạ dày: 2 gói sau hai bữa ăn chính, tối đa 4 gói mỗi ngày.

Dùng bằng cách đổ trực tiếp bột từ gói vào miệng và để tan dần.

Lưu ý: Trẻ từ 6 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Liều dùng cần thiết để đạt được hiệu quả điều trị hầu như không gây tác dụng phụ. Sản phẩm có thể gây tác dụng nhuận tràng nhẹ do chứa xylitol.

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC VÀ THỰC PHẨM BỔ SUNG

Do có chứa các chất hấp phụ, **CAPTOGASTRIL®** stick pack có thể làm chậm hoặc giảm hấp thu các thuốc dùng đồng thời. Ví dụ, có thể ảnh hưởng đến các thuốc kháng acid, thuốc chống động kinh, kháng sinh, thuốc điều trị tiểu đường và thuốc tuyến giáp như levothyroxine. Cũng nên dùng sản phẩm cách các viên tránh thai ít nhất 2 giờ. Trong mọi trường hợp, luôn được khuyến cáo mạnh mẽ là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị y tế có khả năng hấp phụ như **CAPTOGASTRIL®** stick pack.

Hiện chưa ghi nhận tương tác với thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, tất cả các loại thực phẩm bổ sung bao gồm vitamin, dưỡng chất, thảo dược và thuốc vi lượng đồng căn nên được dùng cách **CAPTOGASTRIL®** stick pack ít nhất hai giờ.

BẢO QUẢN

CAPTOGASTRIL® stick pack cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, không quá 25°C. Không sử dụng sản phẩm nếu gói bị hư hỏng. Tránh xa tầm tay trẻ em.

CẢNH BÁO VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ từ 6 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm có chứa muối natri và magnesi – cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang điều trị thuốc hoặc tuân thủ chế độ ăn uống đặc biệt. Thời gian cần thiết để đạt hiệu quả mong muốn phụ thuộc vào nguyên nhân gây dư thừa khí.

Không phù hợp với bệnh nhân bị tăng natri máu hoặc tăng magnesi máu. Nếu bị tăng huyết áp, chỉ sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không sử dụng sản phẩm quá 30 ngày liên tiếp nếu triệu chứng vẫn còn, cần hỏi ý kiến bác sĩ.

Không dùng sản phẩm nếu có tiền sử dị ứng hoặc không dung nạp với bất kỳ thành phần nào.

Mỗi gói stick pack chỉ sử dụng một lần, mở ra ngay trước khi dùng.

HẠN SỬ DỤNG

Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn ghi trên bao bì. Ngày hết hạn áp dụng cho sản phẩm còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng cách.

XỬ LÝ RÁC THẢI

Thiết bị đã hết hạn hoặc cần loại bỏ phải được xử lý theo quy định về quản lý rác thải y tế của cơ quan địa phương. Tuyệt đối không vứt bỏ sản phẩm hoặc bao bì ra môi trường. Ngày cập nhật lần cuối: 07/2024

NHÀ SẢN XUẤT:

SIIT S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Ý

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM:

Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, 20/12 ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội.