

Nhãn tuýp



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/12/2015

llh

Nhãn hộp



Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

CÔNG TY
CÓ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Hà Xuân Sơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Kem bôi da CENESTHEN

Quy cách: Hộp 01 tuýp, tuýp 10 gam

Thành phần: Mỗi tuýp 10g kem có chứa

Clotrimazol 100,0 mg

Tá dược: Dầu parafin, Alcol cetylic, Alcol cetostearylic, Vaseline trắng, Span 60, Tween 60, Propylen glycol, Methyl paraben, Propyl paraben, Dimethicon, Tinh dầu hoa hồng, Nước tinh khiết vừa đủ 10 g.

Dược lý và cơ chế tác dụng

Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên *Trichomonas*, *Staphylococcus* và *Bacteroides*. Không có tác dụng với *Lactobacilli*.

Cơ chế tác dụng: liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.

Dược động học

Clotrimazol rất ít được hấp thu khi bôi trên da. Sáu giờ sau khi bôi kem, nồng độ Clotrimazol thay đổi từ 100 microgam/cm³ trong lớp sừng đến 0,5 – 1 microgam/cm³ trong lớp gai và 0,1 microgam/cm³ trong lớp mô dưới da.

Chỉ định

- Điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: Bệnh nấm da, bệnh nấm *Candida* ngoài da, nấm kẽ ngón tay, ngón chân, lang ben do *Malassezia furfur*, viêm móng và quanh móng...

Liều dùng – cách dùng

Bôi nhẹ một lượng thuốc vừa đủ lên vùng da bị bệnh, ngày 2 – 3 lần.

Nếu bệnh không đỡ sau 4 tuần điều trị, cần phải xem lại chuẩn đoán. Bệnh thường đỡ trong vòng 1 tuần điều trị, có khi phải điều trị đến 8 tuần.

Chống chỉ định

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Tác dụng không mong muốn

Vùng bôi thuốc có thể bị bong nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng

Không dùng Clotrimazol cho điều trị nấm toàn thân
Thông báo với thầy thuốc nếu có biểu hiện kích ứng ở vùng bôi thuốc (đỏ, ngứa, bong, mụn nước, sưng), dấu hiệu của sự quá mẫn.

Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị, nếu không đỡ cần khám lại.

Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm

Thời kỳ mang thai và đang cho con bú: Được dùng

Tương tác thuốc:

Chưa có thông báo về tác động hiệp đồng hay đối kháng giữa clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay flucytosin với các loài *Candida albicans*.

Quá liều và xử trí:

Nhiễm độc cấp tính được xem như không thể xảy ra khi xử dụng quá liều (sử dụng trên một diện tích lớn trong điều kiện thuận lợi cho sự hấp thu) hoặc vô ý uống thuốc. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Trong trường hợp vô ý nuốt thuốc, các biện pháp thông thường như rửa dạ dày chỉ nên thực hiện nếu các triệu chứng lâm sàng của quá liều trở nên rõ ràng (ví dụ như chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn).

Người vận hành máy móc hoặc lái xe: Được dùng

Bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng, kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: Theo TCCS

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Nhà sản xuất: Công ty CP Dược TW Mediplantex

358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Sản xuất tại: Trung hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Hà Xuân Sơn



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy