

MẪU NHÃN CHLOROCINA - H

1. Nhãn tuýp Chlorocina - H 4g



2. Nhãn hộp 1 tuýp Chlorocina - H 4g



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc mỡ tra mắt

CHLOROCINA-H

Thành phần: Tính cho 1 tuýp thành phẩm (4g):

<u>Thành phần</u>	<u>Hàm lượng</u>
Chloramphenicol	0,04 g
Hydrocortison acetat	0,03 g
Vaselin	2,4 g
Lanolin	0,17 g
Parafin khan	1,36 g

Tác dụng dược lý:

- Cloramphenicol là kháng sinh có trọng lượng phân tử thấp, chủ yếu tan trong mỡ, tác dụng trên vi khuẩn gram dương, gram âm, xoắn khuẩn, *salmonella*, *rickettsiae* và *chlamydiae* (mắt hột). Cơ chế tác dụng của cloramphenicol ức chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 50S của ribosom.

- Hydrocortison là corticoid tiết từ vỏ thượng thận, thuộc nhóm glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, chống ngứa và ức chế miễn dịch.

Dược động học:

- Thuốc mỡ tra mắt Chlorocina-H có tác dụng tại chỗ ở mắt. Sau khi tra, thuốc được hấp thu vào thủy dịch. Những nghiên cứu ở người bệnh đục thể thủy tinh cho thấy mức độ hấp thu thay đổi theo dạng thuốc và số lần dùng thuốc. Nồng độ thuốc trong thủy dịch cao nhất khi dùng thuốc mỡ tra mắt nhiều lần trong ngày.

Chỉ định:

Trong các trường hợp viêm mí, viêm kết mạc, củng mạc, viêm màng bồ đào, viêm mắt đồng cảm, viêm nội nhãn, viêm thần kinh thị giác, viêm sau chấn thương, sau khi mổ.

Liều dùng - cách dùng:

- Tra một dải thuốc mỡ (khoảng 0,5cm) vào mắt bị bệnh.
- Ngày tra 3-4 lần.

Chống chỉ định:

- Dị ứng với các thành phần của thuốc.
- Viêm giác mạc do herpes zoster, viêm gai giác mạc, viêm giác mạc có mủ tiền phòng, viêm móng mắt có mủ tiền phòng. Bệnh mắt hột. Lao mắt. Loét giác mạc.

Thận trọng:

- Cloramphenicol được dùng tại chỗ kết hợp với corticosteroid trong một số trường hợp nhiễm khuẩn mắt. Tuy vậy, phải cân nhắc lợi ích của liệu pháp kết hợp này với sự giảm sức đề kháng đối với nhiễm khuẩn, nấm hoặc virus, và sự làm mất những dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm khuẩn hoặc của phản ứng quá mẫn do corticosteroid.

Chú ý: Cloramphenicol dùng tại chỗ cũng có thể gây các phản ứng có hại nghiêm trọng do vậy cần tránh lạm dụng và tránh dùng dài ngày.



mu

Không bao giờ được dùng glucocorticoid trong nhiễm khuẩn đang tiến triển, trừ trường hợp đã dùng thuốc chống nhiễm khuẩn trước đó. Mặt khác, vẫn có nguy cơ làm tăng nhiễm khuẩn do bị ức chế miễn dịch khi dùng glucocorticoid.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Những tác dụng không mong muốn của cloramphenicol có thể rất nghiêm trọng, do đó phải tránh việc điều trị kéo dài hoặc nhắc lại. Thiếu máu bất sản là biến chứng nguy hiểm nhất do dùng cloramphenicol nhỏ mắt. Mặc dù cloramphenicol ít hấp thu vào máu nhưng những bệnh nhân có tiền sử bản thân hay gia đình suy tuỷ thì không nên dùng.

Trong điều trị glucocorticoid dài ngày, ADR phổ biến nhất là trạng thái dạng Cushing và chứng loãng xương ở một mức độ nào đó.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

Tương tác thuốc: Chưa thấy đối với dạng bào chế mỡ tra mắt.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không nên dùng cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn trong quá trình lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng quá liều:

- Chưa có trường hợp quá liều khi dùng thuốc tra mắt.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 4g.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý: Sau khi mở nắp, phải bảo quản thuốc cẩn thận, không để đầu tuýp bị dây bẩn. Khi tra thuốc, không để đầu tuýp chạm vào mí mắt. Tuýp thuốc đã mở nắp sử dụng sau 1 tháng nên bỏ đi.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Tiêu chuẩn áp dụng: Theo tiêu chuẩn cơ sở.

THUỐC BÁN THEO ĐƠN
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Nhà sản xuất và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 46 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 052.3822346 - 3 822475. Fax: 052.3820720.

Ngày 25 tháng 12 năm 2011

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ds. Nguyễn Thị Mai