



MẪU NHÃN

A/137

1. Nhãn trên lọ 50 viên:



2. Nhãn hộp 1 lọ × 50 viên



Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Tri, MBA



PHARMACEUTICAL JSC



- ✓ Hỗ trợ điều trị cholesterol máu cao
 - ✓ Điều trị hỗ trợ trong bệnh béo phì

SUMA
03/12/2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thành phần:

Chia sẻ

- Nguu tát (Radix Archyranth) **https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8000000/**
 - Tương ứng với 200 mg cao khô
 - Nghệ (Rhizoma curcumae longae) **500mg**
 - Tương ứng với 5 mg hỗn hợp Curcumin
 - Rutin **100mg**
 - Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột mì, PVP K30, Magnesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ 1 viên.

Chi định

- Hỗ trợ điều trị cholesterol máu cao
- Điều trị hỗ trợ trong bệnh béo phì

Lieu lượng - Cách dùng:

Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc
địa chỉ trang web

11

- Liều khởi đầu: mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
 - Liều duy trì: mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần

T्रẻ em:

 - Liều khởi đầu: mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

- Điều duy trì

- Chóng chỉ định:**

 - Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc.
 - Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

*Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Khuyến cáo:

- Uống thuốc sau bữa ăn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ

- Trình bày và bảo quản:**

06 x3 film truy cập

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
 - Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Cholestin

VIEN NANG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC														
Viên nang CHOLESTIN														
Thành phần : Cho 1 viên														
<table border="1"> <tr> <td>Nguu tất (Radix Archyranthis bidentatae)</td><td>: 500 mg</td><td>Tương ứng với 200 mg cao khô</td></tr> <tr> <td>Nghệ (Rhizoma curcumae longae)</td><td>: 500 mg</td><td>Tương ứng với 5 mg hỗn hợp Curcumin</td></tr> <tr> <td>Rutin</td><td>: 100 mg</td><td></td></tr> <tr> <td>Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột mì, PVP K30, Magiesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ.....</td><td>: 1 viên</td><td></td></tr> </table>			Nguu tất (Radix Archyranthis bidentatae)	: 500 mg	Tương ứng với 200 mg cao khô	Nghệ (Rhizoma curcumae longae)	: 500 mg	Tương ứng với 5 mg hỗn hợp Curcumin	Rutin	: 100 mg		Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột mì, PVP K30, Magiesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ.....	: 1 viên	
Nguu tất (Radix Archyranthis bidentatae)	: 500 mg	Tương ứng với 200 mg cao khô												
Nghệ (Rhizoma curcumae longae)	: 500 mg	Tương ứng với 5 mg hỗn hợp Curcumin												
Rutin	: 100 mg													
Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột mì, PVP K30, Magiesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ.....	: 1 viên													
Dược lực :														
<ul style="list-style-type: none"> - Theo Đoàn Thị Nhu: Nguu tất có tác dụng hạ Cholesterol máu và hạ huyết áp. - Dịch chiết cồn Nghệ có tác dụng hạ Cholesterol huyết, giảm VLDL, LDL và làm tăng HDL. Ngoài ra, curcumin trong nghệ có tác dụng chống tạo sỏi Cholesterol trong mật. - Rutin có tác dụng làm tăng tính bền mao mạch. Theo Pharmacol Res 1999 Dec; 40(6):493-6 thì rutin trong hoa hồng có tác dụng hạ Triglycerid máu. 														
Dược động học: Không có thông tin														
Chỉ định : Thuốc dùng trong các trường hợp														
<ul style="list-style-type: none"> - Điều trị cholesterol máu cao - Phòng ngừa xơ vữa động mạch, cao huyết áp - Điều trị hỗ trợ trong bệnh béo phì - Liều lượng - Cách dùng: 														
Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc dùng liều trung bình là														
<ul style="list-style-type: none"> - Người lớn: Liều khởi đầu: mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần. Liều duy trì: mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần - Trẻ em: Liều khởi đầu: mỗi lần 1/2 viên, ngày 3 lần. Liều duy trì: mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần. 														
https://trungtamthuoc.com/														
Chống chỉ định :														
<ul style="list-style-type: none"> - Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc. - Phụ nữ có thai và đang cho con bú 														
Tác dụng không mong muốn: Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.														
*Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc														
Phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.														
Lái xe và vận hành máy móc: Chưa ghi nhận được ảnh hưởng nào trên người lái xe hay vận hành máy móc.														
Tương tác thuốc : Không có thông tin.														
Quá liều: Không có thông tin														
Khuyến cáo :														
<ul style="list-style-type: none"> - Uống thuốc sau bữa ăn. - Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng. - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ. 														
Trình bày và bảo quản :														
<ul style="list-style-type: none"> - Thuốc đóng trong lọ 50 viên, hộp 1 lọ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. - Đè thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.. ĐÈ XA TÀM TAY TRÈ EM - Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất 														
Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS														
Thuốc được sản xuất tại : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - TP Đà Nẵng Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com Điện thoại tư vấn: 0511.3760131 Và phân phối trên toàn quốc														