



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

CHOLIN ALFOSCAT

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em

Không được tiêm

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC: Mỗi ống 7ml chứa:

Thành phần dược chất:

Cholin alfoscat..... 600 mg

Thành phần tá dược: Methylparaben, Propylparaben, Propylen glycol 400, Natri saccharin, Hương cam, Nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch uống

Mô tả: Dung dịch trong, màu vàng cam, mùi thơm, vị ngọt

CHỈ ĐỊNH:

Cholin alfoscat được chỉ định để điều trị trong:

Thoái hóa hoặc hội chứng sa sút trí tuệ hoặc suy giảm mạch máu não thứ phát, như rối loạn nhận thức nguyên phát hoặc thứ phát ở người cao tuổi, biểu hiện là suy giảm trí nhớ, lú lẫn, mất phương hướng, giảm vận động và giảm chủ động, mất tập trung. Sự thay đổi về tâm trạng và hành vi ứng xử: cảm xúc không ổn định, hay cáu gắt, thờ ơ. Trầm cảm giả ở người cao tuổi.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:

Dùng 1 ống/lần x 2 lần/ngày.

Liều có thể tăng theo chỉ định của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với cholin alfoscat hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Để xa tầm tay trẻ em.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chỉ định điều trị của thuốc này không áp dụng trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể đã nhấn mạnh về sự thiếu ảnh hưởng gây độc cho phôi thai và gây quái thai.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Là tiền chất của các thành phần sinh học, việc sử dụng cholin alfoscat kéo dài thường không gây ra các vấn đề về khả năng dung nạp.

Khả năng xảy ra buồn nôn (có thể do hoạt hóa dopaminergic thứ phát) có thể cần giảm liều.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Xem phần Tác dụng không mong muốn của thuốc.

Không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Nếu xảy ra quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.



ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Nhóm dược lý: Thuốc hệ thần kinh khác

Mã ATC: N07AX02

Cholin alfoscerat như một chất mang của cholin và tiền chất của phosphatidylcholin, có khả năng phòng ngừa và khắc phục các tổn thương sinh hóa, được công nhận là có hiệu quả đặc hiệu trong số các yếu tố gây bệnh di truyền của hội chứng tâm thần thoái triển, nghĩa là giảm trương lực cholinergic và thay đổi thành phần phospholipid của màng tế bào thần kinh.

Cấu trúc hóa học của cholin alfoscerat (chứa 40,5% cholin) và các đặc tính hóa lý liên quan đến nó đảm bảo cung cấp đáng kể chất có hoạt tính và bảo vệ chuyển hóa cho mô não.

Kết quả của các xét nghiệm thực nghiệm về dược lý tiền lâm sàng và các nghiên cứu lâm sàng đã xác nhận khả năng can thiệp có lợi của cholin alfoscerat vào các chức năng nhận thức và trí nhớ, cũng như trên khía cạnh tâm trạng và hành vi bị tổn hại bởi bệnh lý não thoái triển.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Các đặc tính dược động học, được xác định bằng cách sử dụng chất đánh dấu, tương tự ở các loài động vật khác nhau được sử dụng (chuột, chó, khỉ) cho thấy: hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa; hấp thu và phân bố nhanh chóng trong các mô và cơ quan khác nhau, bao gồm cả não; chỉ bài tiết qua thận (khoảng 10%, trong 96 giờ của liều uống phóng xạ); khả dụng trong não cao hơn chất được đánh dấu bằng triti.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 30 ống 7 ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Website: www.abiphagroup.vn

Điện thoại: 024.33520098

Fax: 024.63253888