

CHOPHYTOL[®]

actisô

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

THÀNH PHẦN

Actisô (*Cynara Scolymus*) cao khô của lá 200 mg

Tá dược: Magne trisilicate, tinh bột bắp tiền gelatin hoá, talc, magne stearate, gôm lac, colophane, gelatine, saccharose, calci carbonate, chất tán màu, sáp carnauba, polysorbate 80 vừa đủ 1 viên bao 350 mg. Mỗi viên chứa 0,08 g sucrose.

DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Viên bao. Hộp 1 lọ 180 viên.
Hộp 2 vỉ hoặc 6 vỉ x 30 viên.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc có tác dụng lợi tiểu, thông mật và lợi mật được dùng để cải thiện chức năng đào thải của cơ thể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN.

Uống 1 đến 2 viên với nước trước 3 bữa ăn chính hoặc khi triệu chứng xảy ra.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, đặc biệt với methyl parahydroxybenzoat và ethyl parahydroxybenzoat.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Không dùng trong trường hợp bị tắc ống mật và suy tế bào gan nặng.
Ngưng dùng thuốc trong trường hợp bị tiêu chảy hoặc đau bụng.

TƯƠNG TÁC THUỐC : Không có

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Nguy cơ bị tiêu chảy ở liều cao.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

LIỆU PHÁP THỰC VẬT NHẪM MỤC ĐÍCH THÔNG MẬT VÀ LỢI MẬT
Chophytol tác động trên gan và thận.

- Tác động trên gan, kích thích tiết mật và tăng đào thải mật vào ruột.
- Tác động trên thận, tăng đào thải nước tiểu qua đường niệu.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG

Để xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT

Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA
Văn phòng: 68, rue Jean-Jacques
Rousseau - 75001 PARIS -
PHÁP
Nhà máy: 2, avenue de Traité de Rome -

