

Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

## CIMACIN

SDK: VD-24628-16

- ◆ **THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:  
*Hoạt chất:* L-Cystine ..... 500 mg  
*Tá dược:* Dầu đậu nành, sáp ong trắng, dầu lecithin, dầu cọ, gelatin, glycerin đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, nước tinh khiết, sunset yellow FCF, quinolin, allura red AC, titan dioxyd.
- ◆ **DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang mềm.
- ◆ **CHỈ ĐỊNH**  
Hỗ trợ điều trị các trường hợp sau:
  - Viêm da do thuốc.
  - Sạm da, tàn nhang, sạm nắng...
  - Eczema, mề đay, phát ban da, mụn trứng cá.
  - Các bệnh biểu bì làm móng tóc khô giòn dễ gãy.
- ◆ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: Liều dùng thông thường là 2-4 viên/ngày.  
Có thể dùng liên tục CIMACIN trong thời gian 10-20 ngày mỗi tháng.
- ◆ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Bệnh nhân quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- ◆ **CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**  
*Thận trọng*
  - Nếu xảy ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, ngứa, chán ăn và khó chịu ở bụng, nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
  - Tuân theo dùng liều dùng được đề nghị.
  - Trong trường hợp dùng thuốc đối với trẻ em, phải có sự hướng dẫn của người lớn. Không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi.
  - Nếu thuốc không có hiệu quả sau khi dùng 2 tuần, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Cảnh báo*
  - Không nên dùng CIMACIN cho những bệnh nhân bị suy nhược chức năng thận nặng và hôn mê gan.
  - Nên dùng CIMACIN thận trọng ở những bệnh nhân bị cystine niệu.
- ◆ **TƯƠNG TÁC THUỐC**  
Chưa có báo cáo.
- ◆ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**  
Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật sự cần thiết và dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.
- ◆ **ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**  
Chưa có báo cáo.
- ◆ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**  
Chưa có báo cáo.  
*\* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*
- ◆ **QUẢ LIỀU**  
Chưa có báo cáo.
- ◆ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
- ◆ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
*\* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*
- ◆ **ĐÓNG GÓI:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm  
Hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương